

**Producent:**

Denka International b.v. Holandia

**Dystrybutor:**

ZPUH "Best Pest" Małgorzata Świętosławska,

Jacek Świętosławski Spółka Jawna

ul. Moździerzowców 6 b

43-602 Jaworzno

tel: 0-prefix-32 617 75 71

fax: 0-prefix-32 615 00 07

## Muchomox

Pozwolenie MZ nr **0328/03** na obrót produktem biobójczym

Preparat owadobójczy do bezpośredniego stosowania jako granulowana trutka lub do sporządzania zawiesiny, przeznaczony jest do zwalczania much w pomieszczeniach inwentarskich jak chlewnie, obory, kurniki.

Zawiera 1% metomylu (insektycyd z grupy związków karbaminianowych) oraz trikozen - feromon wabiący muchy. Dodatek soli denatonium, substancji bardzo gorzkiej, zapobiega przypadkowemu spożyciu.

R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

**Sposób użycia:**

Preparat stosować w ilości ok. 25 g na 10 m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczenia.

**Jako posypka** - w oborach, chlewniach. Rozsypywać bezpośrednio z opakowania na suchą ziemię lub inne podłoże, tylko w miejscach niedostępnych dla zwierząt. Dla zwiększenia bezpieczeństwa stosowania wskazane jest umieszczenie preparatu w pojemnikach (karmnikach) i rozstawieniu w miejscach przebywania much. Nie stosować w miejscach, w których są przeciągi.

**W formie zawiesiny** - w oborach i innych budynkach inwentarskich. Wymieszać trzy części wagowe preparatu z jedną częścią wagową wody (3:1) do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić przez kilka godzin. Następnie rozprowadzić za pomocą pędzla w miejscach częstego przebywania much na powierzchniach nasłonecznionych, które są niedostępne dla zwierząt m.in. okiennice, belki, odsłonięte elementy konstrukcyjne.

Uwaga! Preparat w postaci zawiesiny barwi zaimpregnowane powierzchnie na kolor żółty.

**Środki ostrożności:**

- Chronić dzieci i zwierzęta przed kontaktem z preparatem.
- Muchomox stosować: w chlewniach powyżej 1,5 m, a w oborach - powyżej 2 m od podłogi.
- Nie dotykać preparatu gołymi rękami; podczas przygotowywania i używania zawiesiny stosować rękawice ochronne, granulát rozsypywać bezpośrednio z opakowania.
- Nie stosować na powierzchniach, z którymi będzie stykała się żywność, pasza, naczynia na żywność, żłoby i poidła oraz miejsca, z którymi mają kontakt zwierzęta i ptactwo.
- Po zakończeniu pracy z preparatem umyć starannie ręce i twarz wodą i mydłem.
- Opakowania zniszczyć jak odpady komunalne.

**Przechowywanie**

Muchomox przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w miejscach suchych i chłodnych, niedostępnych dla dzieci, osób niepowołanych i zwierząt, z dala od żywności i pasz.

**Pierwsza pomoc:**

Miejsce przypadkowego zetknięcia się preparatu ze skórą dokładnie umyć wodą z mydłem, oczy starannie przepłukać dużą ilością wody (skonsultować się z okulistą).

W przypadku spożycia dokładnie wypłukać usta wodą (nie podawać do picia mleka, oleju ani alkoholu). Skontaktować się natychmiast z lekarzem, pokazać etykietę preparatu.

Muchomox zawiera jako substancję czynną metomyl – insektycyd z grupy karbaminianów, będący inhibitorem esterazy cholinowej. Odtrutką jest siarczan atropiny.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 349 28 31, Kraków - (0-12) 683 11 34, Lublin - (0-81) 740 89 83,

Łódź - (0-42) 657 99 00, Poznań - (0-61) 847 69 46, Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Rzeszów - (0-17) 853 45 17, Warszawa - (0-22) 619 66 54, Wrocław - (0-71) 343 30 08

Zawartość netto:

Data produkcji:

Data ważności:

Numer serii: