

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Z.P.U.H. "Best-Pest" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J.
ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno,
Tel: (0-32) 617 75 71, fax.: (0-32) 615 00 07, e-mail: handel@bestpest.com.pl

***Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.***

Normix-AT GR

Środek gryzoniobójczy o działaniu żołądkowym, w formie granulowanej przynęty.
Antykoagulacyjny środek przeznaczony do zwalczania gryzoni normikowatych i myszowatych.

Zawartość substancji aktywnej:

brodifakum - 3[3-(4'-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4 hydroksykumaryna (związek z grupy pochodnych kumaryny) - 0,001 %

**Zezwolenie MRiRW Nr 749/2000 z dnia 19.06.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-279/2003p z dnia 05.08.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-479 /2007 z dnia 21.12.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-20/2008 z dnia 24.01.2008 r.**



UWAGA:

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**
- 3. Zabrania się stosowania środka w ogrodach przydomowych i rodzinnych ogrodach działkowych.**

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI:

- rośliny rolnicze, sadownicze, warzywne, szkółki leśne, przechowalnie sadzonek drzew.

-karczownik ziemnowodny, mysz zaroślowa, mysz polna, norniki.

Środek stosować:

- wykładając w porcjach po 15-40 g na jeden punkt trucia do profesjonalnych stacji deratyzacyjnych
- punkty trucia umieszczać co 5-10 m bezpośrednio w korytarzach lub norach gryzoni, na ścieżkach przebiegu gryzoni, przy otworach nor lub w pobliżu pni drzew tj. w miejscach gnieźdzenia się nornika polnego i karczownika ziemnowodnego, tak, aby jeden punkt przypadał na około 30 - 40 m² powierzchni.

Zalecana dawka:

gdy liczebność gryzoni jest niska 4-6 kg/ha

gdy liczebność gryzoni jest wysoka 8-12 kg/ha

W miarę potrzeby trutkę uzupełnić, ale nie częściej, niż co 7-10 dni.

UWAGI:

1. Nie stosować środka bezpośrednio na glebę, a także na obrzeżach pól.
2. Tereny potraktowane środkiem nie kosić przed upływem 14 dni oraz nie wpuszczać na nie zwierząt gospodarskich przez 1 miesiąc od ostatniego przeprowadzonego zabiegu.
3. Po akcji zwalczania gryzoni punkty trucia zlikwidować, a nie pobrany przez gryzonia preparat zebrać i zakopać głęboko w ziemi
4. Środek zabija również gryzonia odporne na warfarynę i inne antykoagulanty.
5. Preparat zabija gryzonia po jednorazowym spożyciu. Gryzonia giną po kilku dniach.

OKES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ, ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

PRZECHOWYWANIE

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin w własnym zakresie.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Zatrucia zwierząt hodowlanych (świń, królików, kotów, kur i bażantów) mogą wystąpić po kilkakrotnym spożyciu trutki.

OBJAWY ZATRUCIA

W skrajnych przypadkach krwotoki, osłabienie.

PIERWSZA POMOC:

Natychmiast wezwać lekarza.

W przypadku połknięcia środka wywołać wymioty /np. drażniąc czystym palcem tylną ściankę przełyku lub podając do picia roztwór soli kuchennej/.

Nie podawać do picia mleka, oleju ani alkoholu.

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

ANTIDOTUM:

Witamina K₁ w dawce 40 mg dziennie w mniejszych porcjach (dla dzieci 20 mg).

Odtrutka musi być podana pod opieką lekarza. Opieka jest konieczna do chwili aż czas protrombinowy nie wróci do normy.

Przy silnym i uporczywym krwotoku może być konieczna transfuzja.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

Gdańsk – (0-58) 301-65-16

Rzeszów – (0-17) 866-44-09

Kraków – (0-12) 411-99-99

Sosnowiec – (0-32) 266-11-45

Lublin – (0-81) 740-26-76

Warszawa – (0-22) 619-08-97

Łódź – (0-42) 657-99-00

Wrocław – (0-71) 343-30-08

Poznań – (0-61) 847-69-46

Okres ważności: 2 lata

Data produkcji:

Zawartość netto:

Numer partii: