

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R -280 /2003p z dnia 05.08.2003r.
zmieniającej zezwolenie MRiGŻ Nr 195/97 z dnia 26..06.1997 r.

Producent/Dystrybutor: ZPUH „BEST-PEST” Małgorzata Świątosławska, Jacek Świątosławski Sp. J.; ul. Moździerzowców 6B;
43-602 Jaworzno; tel.: (0-prefiks-32) 617 75 71; fax: (0-prefiks-32) 615 00 07;
e-mail: handel@bestpest.com.pl

N O R M I X G R

Środek gryzoniobójczy o działaniu żołądkowym, w formie granulowanej przynęty.
Antykoagulacyjny środek przeznaczony do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

pol-brodifakum (brodifakum w postaci soli z denatonium)
(związek z grupy pochodnych kumaryny) - 0,001%

Zezw. MRiGŻ. Nr 195/97 z dnia 26.06.1997r..

Zmienione decyzją MRiRW z dnia 21.07.1998r. oraz decyzją MRiRW

Nr R-280/2003p z dnia 05.08.2003r.

Określenie toksyczności:

dla pszczoł – nie dotyczy



Uwaga:

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

- uprawy rolnicze, sadownicze, warzywne, szkółki leśne.

-nornik polny, mysz zaroślowa, mysz polna, karczownik ziemnowodny.

Środek stosować:

1. rozsiewaczem nawozowym lub siewnikiem z podniesionymi redlicami bezpośrednio na powierzchnię gleby pokrytą roślinami (przed zastosowaniem w sadach przykosić chwasty, jeśli są bardzo gęste i wyrosnięte).
2. wykładając w porcjach po 15-40 g, do otworów zamieszkałych nor gryzoni nie zdeptując korytarzy lub do rurek drenarskich, odkrywek w ziemi o wymiarach ok. 20x20x15 cm zamaskowanych deską, darnią, itp. Punkty trucia umieszczać co 5-10 m bezpośrednio na ścieżkach przebiegu gryzoni lub przy otworach nor tak, aby jeden punkt przypadał na około 40 m powierzchni.
3. wykładając doglebowym dozownikiem ciągnikowym w międzyrzędziach lub dozownikiem ręcznym Normix w pobliżu pni drzew tj. w miejscach gnieźdzenia się nornika polnego i karczownika ziemnowodnego

Zalecana dawka:

gdy liczebność gryzoni jest niska 4-6 kg/ha

gdy liczebność gryzoni jest wysoka 8-12 kg/ha.

W miarę potrzeby trutkę uzupełnić, ale nie częściej niż co 7-10 dni.

UWAGI:

1. Nie stosować środka na glebę nie pokrytą roślinami, a także na obrzeżach pól.
2. Tereny potraktowane środkiem nie kosić przed upływem 14 dni oraz nie wpuszczać na nie zwierząt gospodarskich przez 1 miesiąc od ostatniego przeprowadzonego zabiegu.
3. Po akcji zwalczania gryzoni punkty trucia zlikwidować, a nie pobrany przez gryzonie preparat zebrać i zakopać głęboko w ziemi.
4. Środek zabija również gryzonie odporne na warfarynę i inne antykoagulanty.
5. Preparat zabija gryzonie po jednorazowym spożyciu. Gryzonie giną po kilku dniach.
6. Preparat zawiera dodatek hamujący łaknienie gryzoni na drugi dzień po spożyciu śmiertelnej dawki, co zapobiega kumulacji środka i zatruciom ptaków drapieżnych.

PRZECHOWYWANIE

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 30°C.

Preparat nie jest wrażliwy na działanie niskich temperatur.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S37) Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Zużyte opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Środek jest bezpieczny dla ludzi ponieważ w celu ochrony przed przypadkowym spożyciem zawiera niezwykle gorzką dla ludzi sól denatonium.

Zatrucia zwierząt hodowlanych (świń, królików, kotów, kur i bażantów) mogą wystąpić po kilkakrotnym spożyciu trutki.

OBJAWY ZATRUCIA

W skrajnych przypadkach krwotoki, osłabienie.

PIERWSZA POMOC

Natychmiast wezwać lekarza.

W wypadku połknięcia środka wywołać wymioty (np. drażniąc czystym palcem tylną ścianę przełyku lub podając do picia roztwór soli kuchennej).

Nie podawać do picia mleka, oleju, ani alkoholu.

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

ANTIDOTUM:

Witamina K w dawce 40 mg dziennie w mniejszych porcjach, dzieci 20 mg .

Odtrutka musi być podawana pod opieką lekarza. Opieka jest konieczna do chwili aż czas protrombinowy nie powróci do normy.

Przy silnym i uporczywym krwotoku może być konieczna transfuzja.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16

Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99

Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76

Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -