

Załącznik do Decyzji MRiRW Nr R-60/2002/p
z dnia 18.11.2002 r. zmieniającej
zezwolenie MRiGŻ Nr 389/98 z dnia 09.09.1998 r.

Producent/Dystrybutor: Z.P.U.H. "Best-Pest"

Ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno

Tel/ fax.: (032) 6177 571, (032) 6177 562, e-mail: biuro@bestpest.com.pl

PIRIMIX AE

Środek mszycobójczy w formie dyspenseru aerozolu.

Selektywny środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc w roślinach ozdobnych uprawianych przez amatorów w gruncie i pod osłonami.


W roślinie działa wgłębnie.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

pirymikarb (związek z grupy karbaminianów) - 0,02%.

Zezwolenie MRiGŻ.Nr 389/98 z dnia 9.09.1998 r.

Zmienione decyzją MRiRW Nr R-60/2002/p z dnia 18.11.2002 r.



(R10) Środek łatwopalny.

(R36) Działa drażniąco na oczy.



Uwaga!

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny ozdobne (ogrody działkowe i przydomowe, doniczkowe)

- mszyce

Środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu pierwszych mszyc.

Aerzolować dokładnie całą roślinę z odległości 30 cm tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople.

Dokładne pokryć środkiem również dolną strony liści.

UWAGI:

1. Środka nie stosować:

- podczas silnego wiatru
- w czasie silnego nasłonecznienia.

2. W czasie opryskiwania:

- rośliny doniczkowe opryskiwać poza pomieszczeniami mieszkalnymi
- w ogrodach nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny konsumpcyjne

3. Opryskiwać przed wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): **NIE DOTYCZY**

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

PRZECHOWYWANIE

(S 47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0^o - 30^o C.

(S 15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S 1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S 13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S 20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S 36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne.

(S 45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę).

(S 23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S 46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

(S 26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

(S 28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła.

Zużyte opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku na powierzchni ziemi.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

OBJAWY ZATRUCIA

Nadmierne pocenie, ból głowy, osłabienie, omdlenia i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.

PIERWSZA POMOC

Jeśli wystąpił którykolwiek z wymienionych objawów, zwłaszcza gdy znana jest przyczyna zatrucia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, unikać wysiłku; natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.

Zalecenia dla lekarza:

Leczenie:

1. Jeśli wystąpią oznaki i objawy, niezwłocznie wstrzyknąć 3 mg siarczanu atropiny (dzieciom w paru dawkach) i jeśli to konieczne, zabieg powtarzać dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
2. Nie podawać pralidoksyny.

Inne środki zaradcze:

1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech; może okazać się konieczne użycie rurki endotrachealnej lub wykonanie tracheotomii w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Hospitalizować pacjenta co najmniej przez 24 godziny.

W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach zastosować następujące kryteria:

Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 301-65-16, Kraków - (0-12) 411-99-99, Lublin - (0-81) 740-26-76, Łódź - (0-42) 657-99-00, Poznań - (0-61) 847-69-46, Rzeszów - (0-17) 86-644-09, Sosnowiec - (0-32) 266-11-45, Warszawa - (0-22) 619-08-97, Wrocław - (0-71) 34-330-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -