

Producent i Dystrybutor:

ZPUH "Best Pest" Małgorzata Świątosławska,
Jacek Świątosławski Spółka Jawna
ul. Moździerzowców 6 b
43-602 Jaworzno
tel: 0-prefix-32 617 75 71
fax: 0-prefix-32 615 00 07

Toxanox Plus

Pozwolenie MZ nr 0332/03 na obrót produktem biobójczym

Środek gryzoniobójczy

Preparat gryzoniobójczy w formie koncentratu, do zwalczania szkodliwych gryzoni - głównie szczurów i myszy w higienie sanitarnej; w pomieszczeniach, lokalach użyteczności publicznej, hotelach, mieszkaniach, zakładach produkcyjnych, magazynach, obiektach handlowych.

Zawiera: 0,5% soli sodowej warfaryny (pochodna kumaryny)
0,15% soli sodowej kumatetralylu (pochodna kumaryny)



Produkt szkodliwy

R21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

- S2 Chronić przed dziećmi
- S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt
- S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne
- S46 Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

**Sposób użycia:**

Zmieszać preparat z wodą pitną w stosunku 1:1. Otrzymanym roztworem w ilości 3 g (1 mała łyżeczka) zwilżyć 30 g przynęty pokarmowej np. świeży chleb, ciasto. Trutkę wykladać w niskich naczyniach przy żerowiskach gryzoni. Spożytą trutkę uzupełniać w miarę jej ubytku aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni (ok. 14 dni).

Środki ostrożności:

1. Preparat wykładać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt i ptaków.
2. Nie umieszczać na powierzchniach, na których przechowywana jest żywność lub spożywane są posiłki oraz tam, gdzie istnieje możliwość skażenia żywności.
3. Podczas wykładania nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
4. Stosować rękawice ochronne.
5. Wyszukiwać starannie szczątki padłych gryzoni i zniszczyć je przez spalenie lub zakopać głęboko w ziemi, z dala od studni i innych zbiorników wodnych. W ten sam sposób zniszczyć pozostałą po akcji trutkę.
6. Po pracy umyć ręce wodą i mydłem.
7. Puste opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne.
8. Naczyni, łyżek itp. użytych do rozłożenia trutki nie stosować w gospodarstwie domowym.
9. Miejsca przypadkowego zetknięcia się preparatu ze skórą dokładnie umyć, oczy starannie przepłukać wodą.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu suchym, z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz dla zwierząt, w temperaturze powyżej 0°C.

Pierwsza pomoc:

W razie wystąpienia niepokojących objawów - krwotoki i ogólne osłabienie - należy zgłosić się do lekarza. Odtrutką jest witamina K₁ podana doustnie lub w formie zastrzyku (domięśniowo lub dożylnie) wyłącznie pod kontrolą lekarza. Opieka lekarska jest konieczna do chwili aż czas protrombinowy nie wróci do normy.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 349 28 31, Kraków - (0-12) 683 11 34, Lublin - (0-81) 740 89 83,

Łódź - (0-42) 657 99 00, Poznań - (0-61) 847 69 46, Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Rzeszów - (0-17) 853 45 17, Warszawa - (0-22) 619 66 54, Wrocław - (0-71) 343 30 08

Zawartość netto:

Data produkcji:

Data ważności:

Numer serii: