


PRODUCENT
BAYER S.A.S.
16 rue Jean-Marie Ledair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09
Francja

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
BAYER Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 156
02-226 Warszawa
tel. 022 670 36 51

Załącznik nr...¹ do pozwolenia nr...^{0566/04}

FICAM 80 WP

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: MZ-0566/04 z dnia 04.02.2004 r.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PREPARAT DO PROFESJONALNEGO STOSOWANIA.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj treść etykiety/instrukcji stosowania.

SUBSTANCJA CZYNNNA

BENDIOKARB – 800 g/kg
(metylokarbaminianu 2,2-dimetylobenzo-1,3-dioksol-4-ilu) - związek z grupy karbaminianów.

POSTAĆ PRODUKTU

PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ZAWIESINY WODNEJ.

ZASTOSOWANIE

ZWALCZANIE OWADÓW BIEGAJĄCYCH I LATAJĄCYCH (much, komarów, karaluchów, prusaków, mrówek, pluskiew, pcheł i innych) oraz **PTASZYŃCA KURZEGO** w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

W szpitalach, żłobkach, przedszkolach, itp. wolno stosować preparat jedynie na zapleczu tzn. w pomieszczeniach gospodarczych, warsztatach, pralniach.

Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe. Efekt biobójczy następuje po zetknięciu owada z opryskaną powierzchnią.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

H300 Połknięcie grozi śmiercią.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P309+311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Urząd Receptacji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
Regon 015249601

INNE ZAGROŻENIA

Pył może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

SPOSOBY STOSOWANIA

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PREPARATU.

ZWALCZANIE OWADÓW BIEGAJĄCYCH I LATAJĄCYCH należy użyć roztwór roboczy przygotowany przez zmieszanie 15 g preparatu z 5 litrami wody. W pomieszczeniach o dużej liczebności owadów stosować 30 g preparatu zmieszanego z 5 litrami wody. Do zwalczania much stosować 15 g preparatu rozpuszczonego z 5 litrami wody. Dla zwiększenia atrakcyjności powierzchni opryskiwanych do roztworu można dodać 50 g cukru. Preparat wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, wymieszać, uzupełnić do potrzebnej objętości wodą i wymieszać ponownie do powstania jednorodnej zawiesiny. Stosować 50 ml zawiesiny na 1 m² lub opryskiwać do momentu widocznego zwilżenia powierzchni.

Przed zabiegiem usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, produkty spożywcze oraz naczynia kuchenne i stołowe. Opryskiwać płynem roboczym miejsca gromadzenia się i drogi przebiegu owadów, listwy, wszelkie szpary i szczeliny, dolne części ścian, dookoła zlewów, rur wodociągowych i centralnego ogrzewania. Nie opryskiwać powierzchni aparatów i przyrządów używanych do przygotowywania żywności, nie stosować na powierzchniach, na których przechowywana lub spożywana jest żywność lub paszę.

Używać odpowiednich urządzeń do opryskiwania. Aby zwalczyć owady latające należy opryskać cieczą miejsca częstego siadania owadów: ramy okien, ściany, balkony, itp.

ZWALCZANIE PTASZYŃCA KURZEGO (*Dermanyssus gallinae*) **NA FERMACH DROBIU** - PREPARAT FICAM 80WP STOSOWAĆ TYLKO W PUSTYCH POMIESZCZENIACH, BEZ OBECNOŚCI PTAKÓW. MOŻNA STOSOWAĆ W OKRESACH SANITARNYCH PO WYPROWADZENIU STADA Z POMIESZCZENIA.

Preparat stosować w stężeniu 0,3% (15g preparatu FICAM 80WP zmieszać z 5 litrami wody). Dokładnie opryskiwać powierzchnie na których bytuje ptaszyniec. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie szpary, szczeliny, pęknięcia, zakamarki, miejsca w których ptaszyniec chętnie się ukrywa. W przypadku dużego nasilenia szkodnika można zastosować stężenie 0,6% (zmieszać 30g preparatu FICAM 80WP z 5 L wody). Przy zwalczaniu ptaszyńca zużycie cieczy roboczej wynosi 4 litry na 100m² powierzchni.

UWAGA – jednorazowa dezynsekcja nie gwarantuje zwalczania wszystkich faz rozwojowych szkodnika. Zabieg należy powtórzyć. Pierwszy zabieg zaleca się wykonać w ciągu 2 do 4 dni od usunięcia ptaków z kurnika. Po upływie przynajmniej 48 godzin od dezynsekcji preparat należy zmyć z powierzchni, z którymi ma kontakt użytkownik. Na pozostałych powierzchniach można go pozostawić. W miejscach gdzie ze względu na szybki rozwój populacji owadów może pojawić się odporność powinno stosować się rotację preparatów tzn. używać środków zawierających substancje czynne należące do różnych grup chemicznych. W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Przed zabiegiem należy usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, produkty spożywcze oraz naczynia kuchenne i stołowe. Nie opryskiwać powierzchni, na których przyrządza się żywność, nie stosować na powierzchniach na których przechowuje się lub spożywa żywność lub paszę.

- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
- Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy.
- Nie opryskiwać preparatem łóżeczek ani pościeli małych dzieci oraz powierzchni, z którymi będzie stykała się nie zapakowana żywność.
- Nie opryskiwać urządzeń elektrycznych.
- W przypadku obłania ciała preparatem, skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
- Po pracy umyć dokładnie całe ciało wodą z mydłem.
- Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia urządzeń wykorzystywanych do opryskiwania nie wylewać do rzek, dróg wodnych ani w pobliżu studni (preparat jest szkodliwy dla ryb).

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Preparat działa toksycznie przez drogi oddechowe.

Przed użytkowaniem pomieszczenia, w którym wykonano zabieg należy odczekać do czasu wyschnięcia opryskiwanych powierzchni, a następnie dokładnie wywietrzyć.

OBJAWY ZATRUCIA

MIEJSCOWE

Produkt powoduje podrażnienia oczu, skóry i błon śluzowych.

UKŁADOWE

Bradykardia, pocenie się, konwulsje, mdłości, łzawienie, ślinotok, wymioty, biegunka, zwężenie źrenicy, hipotonia, hipersekrecja oskrzelowa, drgawki mięśniowe, paraliż układu oddechowego, senność, śpiączka, niewydolność oddechowa, hipotermia, migotanie przedsionków, skurcz serca.

PIERWSZA POMOC

PORADY OGÓLNE

Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i usunąć w bezpieczny sposób.

WDYCHANIE

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i pozwolić mu odpocząć. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.

KONTAKT PRZEZ SKÓRĘ

Natychmiast myć dużą ilością wody z mydłem przez co najmniej 15 minut.

Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

KONTAKT Z OCZAMI

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

POŁKNIECIE

Pozostawić w spokoju i wypłukać usta. Wywołać wymioty tylko jeśli: 1. poszkodowany jest całkowicie przytomny, 2. brak dostępu do pomocy medycznej, 3. w przypadku połknięcia większej ilości (więcej niż jeden łyk) i 4. spożycie nastąpiło w czasie krótszym niż 1 godzina. (Wymioty nie mogą dostać się do dróg oddechowych). Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.

ANTIDOTUM

BRAK - STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc przedmedyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE W POLSCE

Gdańsk 058 349 28 31

Kraków 012 411 99 99

Warszawa 022 619 66 54

Poznań 061 847 69 46

Z upoważnienia Prezesa
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departament Rejestracji i Kontroli Leków
Elżbieta Bujak

Elżbieta Bujak

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób.

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym i chłodnym (0°C - 30°C) pomieszczeniu wyposażonym w wentylację ogólną. Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych i przemarzaniem. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM

PRODUKT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli to konieczne, po konsultacji z podmiotem zarządzającym i lokalnymi władzami, produkt można oddać na składowisko odpadów lub do spalarni odpadów. Nie odprowadzać do kanalizacji. Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi.

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

ODPADY OPAKOWANIOWE

Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Wydział Rejestracji Produktów Leczniczych

Wzrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa

Regon: 015249601

2014-02-21

