



rok założenia 1981

# KATALOG HANDLOWY



**2024-2025**

[www.bestpest.com.pl](http://www.bestpest.com.pl)

Z.P.U.H. Best-Pest M. Świątosławska, J. Świątosławski Sp. J.  
Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno, PL  
NIP: 6321816464  
ISO: 14001 | ISO: 9001  
BDO: 000003425

[www.bestpest.com.pl](http://www.bestpest.com.pl)  
+48 (32) 617 75 71  
+48 (32) 617 75 62  
[sekretariat@bestpest.com.pl](mailto:sekretariat@bestpest.com.pl)  
[biuro@bestpest.com.pl](mailto:biuro@bestpest.com.pl)

# SPIS TREŚCI



INSEKTYCYDY **OWADOBÓJCZE**

4-16



RODENTYCYDY **GRYZONIOBÓJCZE**

17-23



PRO**EKOLOGICZNE**

24-37



AKCESORIA

38-44



ŚRODKI **OCHRONY ROŚLIN**

45-48



NOWOŚCI

49-55



## Szanowni Państwo,

Z dumą przedstawiamy kolejne wydanie katalogu produktów, których jesteśmy producentem lub dystrybutorem. Już od czterech dekad inspiracją naszego rozwoju pozostają ścisłe kontakty firmy z wiodącymi ośrodkami naukowymi, skupionymi w resortach rolnictwa i przemysłu.

Dominujący obszar zainteresowania firmy to preparaty biobójcze przeciwko szkodnikom sanitarnym. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom nowoczesnego odbiorcy poszerzamy również gamę opartych na naturalnych składnikach preparatów proekologicznych.

Zaplecze logistyczne pozwala na szybkie dostawy towarów do każdego odbiorcy w kraju, a dbałość o wysoką jakość naszych wyrobów oraz ich przystępne ceny gwarantują stabilną pozycję przedsiębiorstwa na rynku krajowym i jego konkurencyjność na rynkach zagranicznych.

### Zamówienia możecie Państwo składać u naszych przedstawicieli:

Robert Dobosz email: [r.dobosz@bestpest.com.pl](mailto:r.dobosz@bestpest.com.pl) ; tel.: 606 371 059


Jarosław Szczepański email: [j.szczepanski@bestpest.com.pl](mailto:j.szczepanski@bestpest.com.pl) ; tel.: 696 062 200

lub w siedzibie firmy:

Tomasz Sadowski email: [t.sadowski@bestpest.com.pl](mailto:t.sadowski@bestpest.com.pl) ; tel.: 604 997 919

Joanna Płoszaj email: [joanna.ploszaj@bestpest.com.pl](mailto:joanna.ploszaj@bestpest.com.pl) ; tel.: 668 663 083

**Zapraszamy do współpracy!**



## UWAGA !

**Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

**Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.**

**Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Zawsze zapoznaj się z etykietą i instrukcją stosowania produktu.**

Wydanie ma charakter informacyjny. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy – finalny produkt może ulec nieznacznym zmianom.  
Aktualna oferta dostępna jest na stronie.

[www.bestpest.com.pl](http://www.bestpest.com.pl)







# INSEKTYCYDY

owadobójcze preparaty do higieny sanitarnej





ASCYP®  
10 WP +

## OPAKOWANIA



**Saszetka 25 g**  
opakowanie zbiorcze  
40 szt. x 25 g - karton  
4000 szt. x 25 g - paleta



**Wiaderko 2 kg**  
160 szt. x 2 kg - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

## OPIS

Preparat owadobójczy w postaci proszku przeznaczony do zwalczania owadów latających (much, moli, meszek) oraz biegających (mrówek) do stosowania wewnątrz obiektów mieszkalnych, budynków użytku publicznego (hotele, restauracje, kin, szpitale, szkoły, stołówki), obiektów inwentarskich i gospodarczych (dojarni, stajni, schronisk dla zwierząt), obiektów przemysłowych (w tym przemysłu spożywczego), handlowo-usługowych, biurowych, sportowych, w pustych magazynach i w środkach transportu oraz na terenach przyległych, tj. na tarasach, chodnikach, balkonach, parkingach, placach o utwardzonej powierzchni.

## Substancja czynna:

Cypermetryna – 100 g/kg

Praletryna – 1 g/kg

| SZKODNIKI                   | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muchy, Mole, Meszki,</b> | <p>Do pierwszego zabiegu długoterminowego przygotować 0,5% ciecz roboczą.</p> <p>Rozpuścić 25 g preparatu w 5 l wody. Dokładnie opryskiwać powierzchnie sufitów, przy oknach oraz inne płaskie przestrzenie, na których siadają owady.</p> <p>Zawartość wystarczy do opryskania 100-150 m<sup>2</sup>.</p>                                                                                                           |
| <b>Mrówki</b>               | <p>Do zabezpieczenia długotrwałego przygotować 1,0% ciecz roboczą w przypadku bardzo dużego zarobaczenia rozpuścić 25 g preparatu w 2,5 l wody.</p> <p>Przy mniejszym stopniu infestacji przygotować 0,5% ciecz roboczą rozpuścić 25 g preparatu w 5 l wody.</p> <p>Opryskiwać wokół listew podłogowych, drzwi, wewnątrz szaf, wokół przewodów wentylacji oraz szpary i szczeliny, w których gnieźdzą się owady.</p> |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## UWAGA!


Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu.

Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 1 godzina.

Po zakończonym zabiegu miejsca potencjalnego kontaktu ze skórą lub żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: natychmiastowy.

W przypadku ponownego pojawienia się insektów, zabieg należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

ASCYP®  
PBO +

## OPAKOWANIA



**Butelka 50 ml**  
opakowanie zbiorcze  
25 szt. x 50 ml - karton  
3000 szt. x 50 ml - paleta



**Butelka 1L**  
opakowanie zbiorcze  
6 szt. x 1L - karton  
450 szt. x 1L - paleta

## OPIS

Preparat owadobójczy w postaci płynu, wodnej zawiesiny mikrokapsulek do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem przeznaczony do zwalczania owadów latających (much, meszek) oraz biegających (mrówek), a także kleszczy do stosowania wewnątrz obiektów mieszkalnych, budynków użytku publicznego (hotele, restauracji, kin, szpitali, szkół, stołówek), obiektów inwentarskich i gospodarczych (dojarni, stajni, schronisk dla zwierząt), obiektów przemysłowych (w tym przemysłu spożywczego), handlowo-usługowych, biurowych, sportowych, w pustych magazynach i w środkach transportu oraz na terenach przyległych, tj. na tarasach, chodnikach, balkonach, parkingach, placach o utwardzonej powierzchni.

**Substancja czynna:**

Cypermetryna – 50 g/l

Butotlenek piperonylu (PBO) – 150 g/l

Praletryna – 1 g/l

| SZKODNIKI       | DAWKA                                                                                                                                                                                                                                                   | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muchy</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ustalić dokładnie potrzebną ilość cieczy roboczej (50 ml cieczy na 1 m<sup>2</sup> opryskiwanej powierzchni).</li><li>• Przygotować 0,5% ciecz roboczą (np. 50 ml preparatu rozcieńczyć wodą do 10 l)</li></ul> | Opryskiwać nasłonecznione fragmenty powierzchni ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza oraz inne miejsca gromadzenia się i przesiadywania owadów.                                                    |
| <b>Mrówki</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ustalić dokładnie potrzebną ilość cieczy roboczej (50 ml cieczy na 1 m<sup>2</sup> opryskiwanej powierzchni).</li></ul>                                                                                         | Opryskać należy drogi przebiegu owadów: okolice listew podłogowych, drzwi, pobliza przewodów wentylacyjnych i c.o. oraz szpary i szczeliny, miejsca gnieźdzenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze; miejsca za listwami itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynku. |
| <b>Kleszcze</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przygotować 1% ciecz roboczą (np. 50 ml preparatu rozcieńczyć wodą do 5 l)</li></ul>                                                                                                                            | Opryskać miejsca pojawienia się pajęczaków: altany, tarasy, zadaszenia pod drzewami, namioty, pomieszczenia inwentarskie i gospodarcze.                                                                                                                                    |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## UWAGA!


Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć.

W przypadku ponownego pojawiania się insektów, zabieg powtórzyć po miesiącu.

Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu.

Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 1 godzina.

Po zakończonym zabiegu miejsca potencjalnego kontaktu ze skórą lub żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem.

ASCYP®  
PBO + RTU

## OPAKOWANIA



**Atomizer 750 ml**  
opakowanie zbiorcze  
6 szt. x 750 ml - karton  
450 szt. x 750 ml - paleta

## OPIS

Gotowy do użycia preparat, w postaci mikrokapsułkowanej zawiesiny przeznaczony do zwalczania owadów latających (much, moli, meszek) oraz biegających (mrówek), a także kleszczy do stosowania wewnątrz obiektów mieszkalnych, budynków użytku publicznego (hotele, restauracji, kin, szpitali, szkół, stołówek), obiektów inwentarskich i gospodarczych (dojarni, stajni, schronisk dla zwierząt), obiektów przemysłowych (w tym przemysłu spożywczego), handlowo-usługowych, biurowych, sportowych, w pustych magazynach i w środkach transportu oraz na terenach przyległych, tj. na tarasach, chodnikach, balkonach, parkingach, placach o utwardzonej powierzchni.

**Substancja czynna:**

Cypermetryna – 0,5 g/l

Butotlenek piperonylu (PBO) – 1,5 g/l

Praletryna – 0,01 g/l

| SZKODNIKI           | DAWKA                                                              | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muchy, Mole, Meszki | 50 ml cieczy wystarcza na 1m <sup>2</sup> opryskiwanej powierzchni | Opryskiwać nasłonecznione fragmenty powierzchni ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza oraz inne miejsca gromadzenia się i przesiadywania owadów.                                                    |
| Mrówki              |                                                                    | Opryskać należy drogi przebiegu owadów: okolice listew podłogowych, drzwi, поблизу przewodów wentylacyjnych i c.o. oraz szpary i szczeliny, miejsca gnieźdzenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze; miejsca za listwami itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynku. |
| Kleszcze            |                                                                    | Opryskać miejsca pojawienia się pajęczaków: altany, tarasy, zadaszenia pod drzewami, namioty, pomieszczenia inwentarskie i gospodarcze.                                                                                                                                    |

**Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.**

**Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## UWAGA !

**Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem aby dokładnie wymieszać jego zawartość**

W przypadku ponownego pojawiania się insektów, zabieg powtórzyć po miesiącu.

Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu.


Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 1 godzina.

Po zakończonym zabiegu miejsca potencjalnego kontaktu ze skórą lub żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem.



# ASCYP®

## Granulat na muchy



### OPAKOWANIA



**Puszka 125 g**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 125 g - karton  
1200 szt. x 125 g - paleta



**Puszka 500 g**  
opakowanie zbiorcze  
6 szt. x 500 g - karton  
768 szt. x 500 g - paleta

### OPIS

Preparat o działaniu pokarmowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania uciążliwych plag much.

#### Substancja czynna:

Imidachlopryd - 50 g/kg

Tetrametryna - 5 g/kg

Zawiera także benzoesan denatonium (substancja o bardzo gorzkim smaku zniechęcająca do przypadkowego spożycia).


| SZKODNIKI |                                 | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muchy     | <b>Opryskiwanie powierzchni</b> | <p>W zbiorniku opryskiwacza rozpuścić 500 g preparatu w 4 litrach letniej wody dokładnie mieszając aż do uzyskania jednolitego roztworu.</p> <p><b>Sposób wykonania zabiegu:</b> Otrzymany roztwór preparatu wystarcza na dezynsekcję w pomieszczeniu o powierzchni 100 m<sup>2</sup>. Bezpośrednio należy opryskać ok. 30 m<sup>2</sup> powierzchni takiego pomieszczenia. Oprysk wykonać w miejscach gromadzenia się much, takich jak: ciepłe i nasłonecznione ściany, ramy okienne, filary, części zagród, rury, itp. Unikać miejsc narażonych na przeciągi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>Malowanie powierzchni</b>    | <p>W osobnym pojemniku rozpuścić 250 g preparatu w 200 ml ciepłej wody dokładnie mieszając aż do uzyskania jednolitej lepkiej zawiesiny do malowania. Otrzymana zawiesina wystarcza na dezynsekcję w pomieszczeniu o powierzchni podłogi 100 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Sposób wykonania zabiegu:</b> Pomalować powierzchnie o wymiarach 10 x 30 cm lub pasy kartonu/folii polietylenowej (rozwinąć) w miejscach gromadzenia się much, takich jak: ciepłe i nasłonecznione ściany, ramy okienne, filary, części zagród, rury, itp. Unikać miejsc narażonych na przeciągi. W pomieszczeniu o powierzchni podłogi 100 m<sup>2</sup> należy pomalować co najmniej 40 takich fragmentów. Preparat osiąga pełną skuteczność po 24 godzinach. W przypadku ponownego pojawienia się insektów zabieg należy powtórzyć. Aby uniknąć powstania oporności owadów zaleca się stosować naprzemiennie z preparatami z innej grupy chemicznej. Po utracie skutecznego działania preparatu zaimpregnowane (pomalowane lub opryskane) powierzchnie dokładnie oczyścić, tablice usunąć lub ponownie nanieść na nie zawiesinę preparatu.</p> |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

UWAGA!

Preparat barwi zaimpregnowane powierzchnie.

# BEST-PEST na mrówki +



## OPAKOWANIA



**Puszka 250 g**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 250 g - karton  
2000 szt. x 250 g - paleta



**Puszka 500 g**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 500 g - karton  
768 szt. x 500 g - paleta



**Wiaderko 1,5 kg**  
sprzedaż pojedyncza



**Wiaderko 3 kg**  
sprzedaż pojedyncza

## OPIS

Preparat owadobójczy w postaci granulowanej przynęty gotowy do użycia, przeznaczony do zwalczania mrówek. Likwiduje wszystkie gatunki mrówek nachodzące do budynków z zewnątrz oraz bytujące w ich pobliżu (na balkonach, tarasach, podjazdach, chodnikach i ścieżkach). Zawiera denatonium - środek zniechęcający do przypadkowego spożycia przez człowieka.

### Substancja czynna:


Praletryna - 1 g/kg  
Permetryna - 2,5 g/kg  
Cypermetryna - 2,5 g/kg  
Butotlenek piperonylu (PBO) - 7,5 g/kg

| SZKODNIKI             | DAWKA                                                                                            | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gniazda mrówek</b> | 10 g preparatu na 1 m <sup>2</sup> powierzchni, na której bytują mrówki lub na 1 gniazdo mrówek. | Rozsypać równomiernie widoczną warstwę na powierzchni gniazda i na ścieżkach, którymi wędrują owady. Wewnątrz pomieszczeń wysypać niewielką ilość preparatu na tacki lub wieczka od słoików i rozstawić w miejscach gromadzenia się mrówek oraz na ścieżkach ich przebiegu. W przypadku zawilgocenia wyłożyć świeżą porcję preparatu. Czas od zastosowania do uzyskania skutku biobójczego: natychmiastowe, pełen efekt biobójczy następuje po 48 godzinach od zastosowania. |

*Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.*

## UWAGA !

Wędrujących od trutki mrówek nie należy niszczyć, gdyż przenoszą one truciznę do gniazda.

CYPER  
100 EC

## OPAKOWANIA



## Butelka 1 L

opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1 L - karton  
480 szt. x 1 L - paleta

## OPIS

Preparat owadobójczy. Płynny koncentrat do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania uporczywych plag much, do stosowania w pomieszczeniach gospodarczych, zakładach produkcyjnych, przetwórstwa spożywczego, magazynach, obiektach inwentarskich (chlewnie, obory, stajnie, kurniki, gołębniki itp.) na elementach powierzchni tych pomieszczeń jak również na powierzchniach urządzeń i sprzętów technologicznych.

## Substancja czynna:

Cypermetyryna - 100 g/l

| SZKODNIKI | DAWKA                                                                                                                                                                                                 | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muchy     | Wstrząsnąć opakowaniem aby dokładnie wymieszać jego zawartość.<br>Przygotować 1% ciecz roboczą np.: 50 ml preparatu rozcieńczyć wodą do 5 l co wystarczy do opryskania 100 m <sup>2</sup> powierzchni | Stosować na nasłonecznione powierzchnie ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza. Opryskowi należy poddać około 30% powierzchni. |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## UWAGA!

Pełen efekt bójczy następuje w czasie 24 godzin.

W przypadku ponownego pojawienia się insektów, zabieg należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 2 godziny.


Obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyschnięciu i starannym wywietrzeniu.

Należy starannie odkażać, przez umycie wodą z detergentem, powierzchnie skażone preparatem, które mogą kontaktować się z żywnością, paszą albo ludźmi i zwierzętami.

Po zakończonym zabiegu miejsca potencjalnego kontaktu ze skórą lub żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem.

# Fly Trap

## PUŁAPKA NA MUCHY W WORKU



### OPAKOWANIA



### OPIS

Jednorazowa pułapka na muchy zawierająca substancje pochodzenia naturalnego. Jednocześnie wabi i odławia wszystkie rodzaje much. Pojemność pułapki: 50 000 much.

#### Sposób użycia:

1. Przetnij folię na górze pułapki zgodnie z przerywaną linią, która zabezpiecza żółty plastikowy daszek.
2. Pociągnij żółty daszek w górę tak, aby powstała wolna przestrzeń, dzięki której muchy wejdą do środka.
3. Zalej pułapkę ciepłą wodą do linii napełnienia maksymalnie 1500 ml wody.
4. Zawieś pułapkę na sznurku.

Produkt zaczyna wabić muchy 2-5 godzin po założeniu pułapki i pozostaje aktywny przez 4 tygodnie lub do momentu całkowitego wypełnienia pułapki.

#### Gdzie powiesić pułapkę:

Na zewnątrz (także w dobrze wentylowanych pomieszczeniach): w ogrodzie, wokół budynków dla zwierząt, wokół hałd kompostu, w okolicach wysypisk śmieci, wybiegu dla kurcząt itp.; na wysokości głowy lub wyżej; pomiędzy miejscem namnażania much a środowiskiem ich bytowania.

### Worek

24 szt. - karton  
lub sprzedaż pojedyncza

## UWAGA !

Warunki pogodowe wpływają na aktywność much i skuteczność pułapki. W czasie upałów pułapki należy umieszczać w półcieniu np. na drzewach, pod zadaszeniem. W niższych temperaturach muchy będą bardziej aktywne w cieplejszych miejscach, dlatego pułapki należy wieszać w bezpośrednim słońcu. Upewnij się, że pułapka nie wysycha, w razie potrzeby uzupełnij wodą do wymaganego poziomu.



Komaropren®  
DIPTRON

## OPIS

Produkt owadobójczy. Wykazuje działanie wobec owadów latających tj. much domowych, komarów, os oraz owadów biegających/pelzających: karaczanów, mrówek, pluskiew, pcheł i pajaków. Działa kontaktowo i żołądkowo.

## Substancja czynna:

Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy (etofenproks) - 10 g/100 g

Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6-propylpiperonylowy (butotlenek piperonylu/PBO) - 20 g/100 g

| SZKODNIKI                                                                                                                                                                                                                                                                         | DAWKA                                                             | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Owady latające:</b><br>Musca domestica ( <b>mucha domowa</b> ),<br>Aedes aegypti ( <b>komar</b> Aedes aegypti),<br>Culex pipiens ( <b>komar pospolity</b> ),<br>Vespula vulgaris ( <b>osa</b> ).                                                                               | Sporządzić 1,4% roztwór.<br>Stosować w dawce 50 ml/m <sup>2</sup> | Opryskiwać nasłonecznione fragmenty powierzchni ścian, okolicę okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza oraz inne miejsca gromadzenia się i przesiadywania owadów.                                                    |
| <b>Owady biegające:</b><br>Blattella germanica ( <b>karaczan prusak</b> ),<br>Blatta orientalis ( <b>karaczan wschodni</b> ),<br>Lasius niger ( <b>mrówka, hurtnica</b> ),<br><b>pospolita</b> ), Cimex lectularius ( <b>pluskwa</b> ),<br>Ctenocephalides felis ( <b>pchła</b> ) |                                                                   | Opryskać należy drogi przebiegu owadów: okolicę listew podłogowych, drzwi, pobliża przewodów wentylacyjnych i c.o. oraz szpary i szczeliny, miejsca gnieźdzenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze; miejsca za listwami itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynku. |
| <b>Pająki:</b><br>Tegenaria domestica ( <b>kątnik domowy</b> )                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Opryskać miejsca gromadzenia się i przesiadywania owadów.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dezynsekcja tkanin</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | Rozpylić na tkaninę produkt rozcieńczony wodą, pozostawić produkt do działania, a następnie odkurzyć lub wyprać obrabianą tkaninę. Nie stosować na odzież lub tkaniny, które będą miały kontakt ze skórą.                                                                  |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## OPAKOWANIA



## Butelka 50 ml

opakowanie zbiorcze  
25 szt. x 50 ml - karton  
3000 szt. x 50 ml - paleta



## Butelka 1 l

opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1 L - karton  
450 szt. x 1 L - paleta

UWAGA!


Nie stosować w obecności ludzi i/lub zwierząt domowych.

Nie wolno stosować w miejscach zabaw dla dzieci, żłobkach i przedszkolach.

Nie stosować na żywność, naczynia kuchenne ani na powierzchnie, na których obrabiana, przygotowywana, spożywana lub podawana jest żywność.

W przemyśle spożywczym produkt stosuje się przez rozpylenie produktu rozcieńzonego wodą na listwy przypodłogowe i podłogi.

# Penta<sup>®</sup> 250 FORTE PLUS



## OPAKOWANIA



**Butelka 50 ml**  
opakowanie zbiorcze  
25 szt. x 50 ml - karton  
3000 szt. x 50 ml - paleta



**Butelka 500 ml**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 500 ml - karton  
924 szt. x 500 ml - paleta



**Butelka 1L**  
opakowanie zbiorcze  
6 szt. x 1L - karton  
450 szt. x 1L - paleta

## OPIS

Preparat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą do zwalczania owadów latających (much, moli, meszek) oraz biegających (mrówek) stosowany wewnątrz obiektów mieszkalnych, budynków użytku publicznego (hotele, restauracji, kin, szpitali, szkół, stołówek), obiektów inwentarskich i gospodarczych (dojarni, stajni, schronisk dla zwierząt), obiektów przemysłowych (w tym przemysłu spożywczego), handlowo-usługowych, biurowych, sportowych, w pustych magazynach i w środkach transportu oraz na terenach przyległych, tj. na tarasach, chodnikach, balkonach, parkingach, placach o utwardzonej powierzchni.

### Substancja czynna:

Imidachlopyrd - 200 g/l

Cypermetyryna - 50 g/l

Praletryna - 1 g/l

| SZKODNIKI                  | DAWKA                                                                                                                                                                                                                                             | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muchy, Mole, Meszki</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ustalić dokładnie potrzebną ilość cieczy roboczej (1 litr cieczy na 20 m<sup>2</sup> powierzchni opryskiwanej).</li><li>• Silnie wstrząsnąć opakowaniem aby dokładnie wymieszać jego zawartość.</li></ul> | Opryskiwać nasłonecznione fragmenty powierzchni ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza oraz inne miejsca gromadzenia się i przesiadywania owadów.                                                    |
| <b>Mrówki</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przygotować 1% ciecz roboczą (np. 50 ml preparatu rozcieńczyć wodą do 5 l).</li></ul>                                                                                                                     | Opryskać należy drogi przebiegu owadów: okolice listew podłogowych, drzwi, pobliza przewodów wentylacyjnych i c.o. oraz szpary i szczeliny, miejsca gnieźdzenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze; miejsca za listwami itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynku. |

**Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.**

**Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## UWAGA!


Przed użyciem wstrząsnąć.

Nie stosować preparatu w miejscach składowania i przetwarzania żywności oraz w pomieszczeniach, w których przebywają alergicy.

W przypadku przerw, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz roboczą dokładnie wymieszać.

Prezentowano wizualizację poglądową ostateczny wygląd opakowań może ulec nieznacznej zmianie.

Wizualizacja poglądowa ostateczny wygląd może ulec nieznacznej zmianie

Penta<sup>®</sup> FORTE  
RTU PLUS

## OPAKOWANIA



**Atomizer 750 ml**  
opakowanie zbiorcze  
6 szt. x 750 ml - karton  
450 szt. x 750 ml - paleta

## OPIS

Insektycyd. Gotowy do użycia preparat w formie płynu przeznaczony do zwalczania owadów latających (much, meszek) oraz biegających (mrówek) do stosowania wewnątrz obiektów mieszkalnych, budynków użytku publicznego (hotele, restauracji, kin, szpitali, szkół, stołówek), obiektów inwentarskich i gospodarczych (dojarni, stajni, schronisk dla zwierząt), obiektów przemysłowych (w tym przemysłu spożywczego), handlowo-usługowych, biurowych, sportowych, w pustych magazynach i w środkach transportu oraz na terenach przyległych, tj. na tarasach, chodnikach, balkonach, parkingach, placach o utwardzonej powierzchni.

**Substancja czynna:**

Imidachlopyrd – 2,0 g/l

Cypermetryna – 0,5 g/l

Praletryna – 0,01 g/l

| SZKODNIKI     | DAWKA                                                                              | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muchy, Meszki | Ilość preparatu 250 ml przeznaczona jest do pokrycia 5 m <sup>2</sup> powierzchni. | Opryskiwać należy nasłonecznione fragmenty powierzchni ścian, okolice okien, lamp, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza oraz inne miejsca gromadzenia się i przesiadywania owadów. Komary: opryskiwać miejsca zacienione, spokojne, zakamarki i naroża ścian. |
| Mrówki        |                                                                                    | Opryskać należy drogi przebiegu owadów: okolice listew podłogowych, drzwi, pobliza przewodów wentylacyjnych i c.o. oraz szpary i szczeliny, miejsca gnieźdzenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze; miejsca za listwami itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynku.                   |

*Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.*

*Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.*

## UWAGA !

Nie stosować na świeżo pomalowane, wapnowane lub otynkowane powierzchnie.

W przypadku ponownego pojawiania się szkodnika zabieg należy powtórzyć.

Okres od zastosowania produktu biobójczego do uzyskania skutku biobójczego: pełna skuteczność po 24 godzinach.

Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu. Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 1 godzina.

Po zakończonym zabiegu miejsca potencjalnego kontaktu ze skórą lub żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem.

Wizualizacja poglądowa ostateczny wygląd może ulec nieznacznej zmianie

# ProAgro® 125 SL +



## OPIS

Preparat owadobójczy w formie koncentratu, przeznaczony do zwalczania owadów latających: much, meszek i moli, stosowany wewnątrz obiektów mieszkalnych, budynków użytku publicznego (hotele, restauracje, kin, szpitale, szkoły, stołówki), obiektów inwentarskich i gospodarczych (dojarni, stajni, schronisk dla zwierząt), obiektów przemysłowych (w tym przemysłu spożywczego), handlowo-usługowych, biurowych, sportowych, w pustych magazynach i w środkach transportu oraz na terenach przyległych, tj. na tarasach, chodnikach, balkonach, parkingach, placach o utwardzonej powierzchni.

### Substancja czynna:

Imidachlopyrd - 100 g/l

Cypermetyryna - 25 g/l

Praletryna - 1 g/l

Zawiera: alkohole C6-12, etoksyloowane, 5-20 TE, benzoesan benzylu.

## SZKODNIKI

## SPOSÓB UŻYCIA

**Muchy,  
Mole,  
Meszki**

**OPRYSKIWANIE POWIERZCHNI.** Sporządzanie cieczy użytkowej: w pojemniku aparatu opryskowego rozpuścić 250 ml ProAgro 125 SL + w 4 litrach letniej wody dokładnie mieszając. Otrzymany roztwór wystarcza na wykonanie zabiegu w pomieszczeniach o powierzchni 100 m<sup>2</sup>. Bezpośredni opryskowi należy poddać około 30% powierzchni przeznaczonej do opryskiwania. Uwaga! W razie bardzo wysokiej infestacji zastosować ciecz użytkową w wyższym stężeniu: rozpuścić 300 ml preparatu ProAgro 125 SL + w 4 litrach wody.

**MALOWANIE POWIERZCHNI.** Sporządzanie cieczy użytkowej: w osobnym pojemniku rozpuścić 250 ml ProAgro 125 SL + w 400 ml letniej wody dokładnie mieszając aż do uzyskania jednolitego roztworu. Uzyskana ciecz wystarcza na wykonanie zabiegu w pomieszczeniach o powierzchni 200 m<sup>2</sup>. Następnie rozprowadzić za pomocą pędzla w miejscach częstego przebywania owadów. Przed wykonaniem zabiegu, malowane powierzchnie starannie oczyścić z kurzu. Można również pomalować tablice (pasy kartonu/folii polietylenowej o wymiarach 10x30 cm) i rozwiesić w miejscach gromadzenia się much, takich jak: ciepłe i nasłonecznione ściany, ramy okienne, filary, części zagród, rury, itp. Unikać miejsc narażonych na przeciągi.

*Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.*

*Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.*

## OPAKOWANIA



**Butelka 125 ml**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 125 ml - karton  
3000 szt. x 125 ml - paleta



**Butelka 250 ml**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 250 ml - karton  
2000 szt. x 250 ml - paleta



**Butelka 500 ml**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 500 ml - karton  
924 szt. x 500 ml - paleta

# UWAGA!

Roztwór bardzo dokładnie rozmieszczać przed użyciem. Czynność mieszania powtórzyć, jeśli zabieg został przerwany na dłużej niż 30 minut.

Ciecz robocza powinna być użyta bezpośrednio po przygotowaniu lub tego samego dnia.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego wynosi 24 godziny dla owadów latających

Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu. Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 1 godzina.



# PROTECT

## Trutka na mrówki faraona



### OPIS

Preparat owadobójczy. Przynęta gotowa do użycia w postaci granulatu, przeznaczona do zwalczania mrówek faraona (dorosłych osobników wraz z królową oraz larw mrówek) wewnątrz budynków.

#### Substancja czynna:

S-metopren - 5 g/kg

| SZKODNIKI             | DAWKA                                                                                                                                       | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mrówka Faraona</b> | 2 karmniki (2,5 g produktu każdy) rozmieszczone na powierzchni 20 m <sup>2</sup> (0,25 g/m <sup>2</sup> ) w pobliżu ścieżek wędrówki mrówek | Stosować produkt w postaci pułapek z przynętą wzdłuż tras wędrówki mrówek robotnic a nie bezpośrednio na niej. Jednokrotna aplikacja produktu w pobliżu ścieżek wędrówki mrówek pozwala na zniszczenie mrówczej kolonii. Produkt wykazuje skuteczność rezydualną od 10 do 14 tygodni od zastosowania. Dla uzyskania lepszego efektu zaleca się pozostawienie karmnika na okres 3 miesięcy nawet gdy insekty zniknęły z pomieszczenia wcześniej. |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

### OPAKOWANIA



**Karmniki z trutką 3 x 2,5g**  
opakowanie zbiorcze  
10 szt. x 3 x 2,5 g - karton



# RODENTYCYDY

gryzoniobójcze preparaty do higieny sanitarnej





NORMIX®



## OPIS

Gotowa do użycia przynęta w postaci granulatu przeznaczona do zwalczania szczurów (Szczur wędrowny, Szczur śniady) i myszy (Mysz domowa) wewnątrz i wokół budynków. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

## Substancja czynna:

Difenakum - 0,005 g/100 g

Preparat zawiera benzoesan denatonium 0,001% czynnik zapobiegawczy, zniechęcający ludzi do spożycia.

| SZKODNIKI | POPULACJA GRYZONI | DAWKA PREPARATU                | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szczury   | Niska             | do 200 g przynęty co 10 metrów | Często kontroluj miejsca wyłożenia przynęty w ciągu pierwszych 10-14 dni, uzupełniaj zjedzony i wymieniaj nadgryziony, zniszczony przez wodę lub zanieczyszczony granulat |
|           | Wysoka            | do 200 g przynęty co 5 metrów  |                                                                                                                                                                           |
| Myszy     | Niska             | do 40 g przynęty co 5 metrów   | Myszy są bardzo ciekawskie. Zaleca się aby podczas kontrolowania/uzupełniania przedstawiać stacje deratyzacyjne w inne miejsca.                                           |
|           | Wysoka            | do 40 g przynęty co 2 metry    |                                                                                                                                                                           |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## OPAKOWANIA



## Wiaderko 1 kg

opakowanie zbiorcze

12 szt. x 1 kg - karton

480 szt. x 1 kg - paleta



## Wiaderko 5 kg

opakowanie zbiorcze

80 szt. x 5 kg - paleta

lub sprzedaż pojedyncza



## Wiaderko 10 kg

opakowanie zbiorcze

40 szt. x 10 kg - paleta

lub sprzedaż pojedyncza

## UWAGA!

W przypadku zwalczania myszy i szczurów zaleca się stosowanie w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych.

Oporne na manipulacje karmniki deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować. Powinny być również przytwierdzone do podłoża.


Uniemożliwić dostęp do przynęty dzieciom, zwierzętom domowym i zwierzętom nie będącym przedmiotem zwalczania (szczególnie psom, kotom, świniom, i ptakom).

Nie stosować produktu z innymi produktami biobójczymi.

# RAT KILLER®

## Perfekt

### Granulat +



#### OPAKOWANIA



#### OPIS

Gotowa do użycia, granulowana przynęta w porcjowanych saszetkach, przeznaczona do zwalczania myszy (*Mus musculus*) lub szczurów (*Rattus norvegicus*) wewnątrz budynków oraz szczurów (*Rattus norvegicus*) wokół budynków przez użytkownika powszechnego.

#### Substancja czynna:

Brodifakum – 0,0025 g/100 g

**Pudełko 140 g**  
opakowanie zbiorcze  
24 szt. x 140 g - karton  
1152 szt. x 140 g - paleta

| SKODNIKI                                                   | POPULACJA | DAWKA                | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Myszy</b><br>wewnątrz oraz<br>na zewnątrz<br>budynków   | niska     | 1 saszetka co 5 m    | Wyłożyć preparat w porcjach, w miejscach najczęściej odwiedzanych przez gryzonie (w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, wzdłuż ścian, w miejscach spokojnych i suchych).<br>Przynęta gotowa do użycia do stosowania wyłącznie w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. |
|                                                            | wysoka    | 1 saszetka co 2 m    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Szczury</b><br>wewnątrz oraz<br>na zewnątrz<br>budynków | niska     | 1-3 saszetki co 10 m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | wysoka    | 1-3 saszetki co 5 m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.**


**Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## UWAGA!

# RAT KILLER®

## Perfekt

### Granulat +



#### OPAKOWANIA



**Wiaderko 1 kg**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1 kg - karton  
480 szt. x 1 kg - paleta



**Wiaderko 3 kg**  
opakowanie zbiorcze  
160 szt. x 3 kg - paleta



**Wiaderko 10 kg**  
opakowanie zbiorcze  
48 szt. x 10 kg - paleta

#### OPIS

Gotowa do użycia granulowana przynęta do zwalczania myszy (*Mus musculus*,) i/lub szczurów (*Rattus norvegicus*) wewnątrz oraz na zewnątrz budynków (mieszkalnych, użyteczności publicznej, inwentarskich, przemysłowych, magazynowych), przez użytkownika profesjonalnego oraz profesjonalnie przeszkolonego w tym zakresie (ekipy DDD).

#### Substancja czynna:

Brodifakum - 0,0025 g/100 g

| SZKODNIKI      | POPULACJA | DAWKA                                             | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myszy          | niska     | 5-20 g przynęty na stację deratyzacyjną, co 5 m   | Wyłożyć preparat w porcjach, w miejscach najczęściej odwiedzanych przez gryzonie (w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, wzdłuż ścian, miejscach karmienia zwierząt hodowlanych, w miejscach spokojnych i suchych, itp.). Przynęta gotowa do użycia do stosowania wyłącznie w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem, odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. W przypadku, gdy stacja deratyzacyjna nie może być zastosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy nie będące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć (wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych przeszkolonych). W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenażujących należy dopilnować aby przynęta nie miała kontaktu w wodą. |
|                | wysoka    | 5-20 g przynęty na stację deratyzacyjną, co 2 m   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szczury        | niska     | 10-60 g przynęty na stację deratyzacyjną, co 10 m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | wysoka    | 10-60 g przynęty na stację deratyzacyjną, co 5 m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szczury (nory) |           | 10-60 g przynęty na norę                          | Tylko użytkownik profesjonalny przeszkolony!<br>Przynętę zabezpieczyć aby inne (nie zwalczane) organizmy nie mogły do niej dotrzeć. Zakryć lub zablokować wyjścia z nor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.**  
**Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## UWAGA!

Kontroluj miejsca wyłożenia przynęty w ciągu pierwszych 3 - 4 dni, uzupełniając zjedzony i wymieniaj nadgryziony, zniszczony przez wodę lub zanieczyszczony granulat.

Jeśli nie ma widocznych oznak aktywności szczurów w pobliżu miejsca wyłożenia przynęty po 7 - 10 dniach, przenieś stację deratyzacyjną do miejsca o większej aktywności.

**Myszy są bardzo ciekawe. Zaleca się aby podczas kontrolowania/uzupełniania przedstawiać stacje deratyzacyjne w inne miejsce.**




# RAT KILLER®

## PERFEKT

### KOSTKA FLUO

#### (BRODITEC WB-50F)



#### OPAKOWANIA



**Wiaderko 3 kg**  
opakowanie zbiorcze  
112 szt. x 3 kg - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza



**Wiaderko 5 kg**  
opakowanie zbiorcze  
96 szt. x 5 kg - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

#### OPIS

Gotowy do użycia rodenticyd w formie przynęty – kostki o wadze jednostkowej ~20 g; do zwalczania myszy (*Mus musculus*) i szczurów (*Rattus norvegicus*), na wszystkich etapach rozwoju. Produkt może być stosowany wewnątrz i wokół budynków, także publicznych i przemysłowych (w tym magazynach, dworcach, ładowniach statków), domach, piwnicach, garażach, szafach. Może być również stosowany w zakładach dystrybucji energii i środkach transportu. Dzięki formułacji z wykorzystaniem technologii pigmentów fluorescencyjnych (FLUO-NP®) przynęta może być łatwo zidentyfikowana nawet w złych warunkach oświetleniowych, jeśli jest oświetlona lampą UV. Gdy gryzonie zjadają przynętę, preparat fluorescencyjny sprawia, że odchody gryzoni są wyraźnie widoczne w świetle UV, co daje możliwość monitorowania aktywności gryzoni. Produkt przeznaczony jedynie dla użytkowników profesjonalnych.

#### Substancja czynna:

Brodifakum – 0,005 g/100 g

| SZKODNIKI                                                                                            | DAWKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mysz domowa</b><br>( <i>Mus musculus</i> )<br>do użytku<br>wewnątrz i wokół<br>budynków:          | <b>Wysoka infestacja:</b><br>Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną.<br>Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.<br><br><b>Niska infestacja:</b><br>Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną.<br>Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.    | Przynęta do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. Stacje te powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych. Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów aktywności gryzoni, w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem. Należy prowadzić ich regularne inspekcje w celu określenia skuteczności, oceny stanu stacji i usunięcia padłych gryzoni, jak również uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. |
| <b>Szczur wędrowny</b><br>( <i>Rattus norvegicus</i> )<br>do użytku<br>wewnątrz i wokół<br>budynków: | <b>Wysoka infestacja:</b><br>Do 100 g przynęty na stację deratyzacyjną.<br>Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.<br><br><b>Niska infestacja:</b><br>Do 100 g przynęty na stację deratyzacyjną.<br>Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m. | Przed zastosowaniem należy koniecznie zapoznać się z treścią zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub do informacji przekazanych w punkcie sprzedaży. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).                                                                                                                                                |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## UWAGA!

Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody lub w pobliżu wód powierzchniowych należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu się z wodą. Stosować rękawice ochronne (wykonane zgodnie z normą EN 374, kategoria III). Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną. Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. Przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł światła.

# RAT KILLER® PASTA FLUO (ZED BF SENSITIVE PASTA FLUO-NP)



## OPAKOWANIA



**Pudełko 150 g**  
opakowanie zbiorcze  
24 szt. x 150 g - karton  
1152 szt. x 150 g - paleta

## OPIS

Gotowa do użycia przynęta w postaci pasty, w pojedynczych saszetkach po 15 g, do kontroli myszy domowych (*Mus musculus*) i szczurów wędrownych (*Rattus norvegicus*), na wszystkich etapach rozwoju, zawierający bardzo silnie działający związek brodifakum. Dzięki swojemu sposobowi działania śmierć gryzoni następuje bez wzbudzania podejrzeń w stosunku do przynęty przez innych członków kolonii szkodników.

Technologia FLUO-NP®: dzięki technologii pigmentów fluorescencyjnych przynęta może być łatwo zidentyfikowana nawet w złych warunkach oświetleniowych. Kiedy przynęta jest zjedzona przez gryzonie, fluorescencyjna formuła sprawia, że odchody gryzoni są wyraźnie widoczne w świetle UV, co daje możliwość monitorowania aktywności gryzoni.

### Substancja czynna:

Brodifakum - 0,0029 g/100 g

| SZKODNIKI                                                                                      | POPULACJA GRYZONI | DAWKA PREPARATU                                                                                                                                                  | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mysz domowa</b><br>( <i>Mus musculus</i> )<br>do użytku wewnątrz i wokół budynków:          | Niska             | Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.   | Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. |
|                                                                                                | Wysoka            | Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Szczur wędrowny</b><br>( <i>Rattus norvegicus</i> )<br>do użytku wewnątrz i wokół budynków: | Niska             | Do 90 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m. | Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. |
|                                                                                                | Wysoka            | Do 90 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## UWAGA!

Do użytku wokół budynków: Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem. Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.

# RAT KILLER® PASTA 50 (BRODITOP PASTA)

Pasta dla profesjonalistów



## OPAKOWANIA



**Pudełko 1 kg**  
opakowanie zbiorcze  
10 szt. x 1 kg - karton  
360 szt. x 1 kg - paleta



**Wiaderko 2,5 kg**  
opakowanie zbiorcze  
160 szt. x 2,5 kg - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza



**Karton 15 kg (2 x 7,5 kg)**  
opakowanie zbiorcze  
28 szt. x 15 kg - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

## OPIS

Gotowy do użycia rodentycyd w formie przynęty – pasty w pojedynczych saszetkach o wadze ~10 g; przeznaczony do zwalczania myszy (*Mus musculus*) i szczurów (*Rattus norvegicus*) na wszystkich etapach rozwoju (do stosowania zarówno wewnątrz, jak i wokół budynków). Produkt przeznaczony jedynie dla użytkowników profesjonalnych.

### Substancja czynna:

Brodifakum – 0,005 g/100 g

| SZKODNIKI                                                                                            | DAWKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mysz domowa</b><br>( <i>Mus musculus</i> )<br>do użytku<br>wewnątrz i wokół<br>budynków:          | <p><b>Wysoka infestacja:</b><br/>Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.</p> <p><b>Niska infestacja:</b><br/>Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.</p>    | <p>Przynęta do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. Stacje te powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych. Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów aktywności gryzoni, w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem. Należy prowadzić ich regularne inspekcje w celu określenia skuteczności, oceny stanu stacji i usunięcia padłych gryzoni, jak również uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie.</p> <p>Przed zastosowaniem należy koniecznie zapoznać się z treścią zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub do informacji przekazanych w punkcie sprzedaży. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod toczony przed szkodnikami (IPM).</p> |
| <b>Szczur wędrowny</b><br>( <i>Rattus norvegicus</i> )<br>do użytku<br>wewnątrz i wokół<br>budynków: | <p><b>Wysoka infestacja:</b><br/>Do 100 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.</p> <p><b>Niska infestacja:</b><br/>Do 100 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## UWAGA!

Stacje deratyzacyjne umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych czy hodowlanych. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Stosować rękawice ochronne (wykonane zgodnie z normą EN 374, kategoria III). Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. Przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł światła.






# PROEKOLOGICZNE

preparaty sprzyjające naturalnej równowadze







## OPAKOWANIA



**Butelka 30 ml**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 30 ml - karton  
3000 szt. x 30 ml - paleta



**Butelka 1L**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1L - karton  
480 szt. x 1L - paleta

## OPIS

Oparty na naturalnych składnikach preparat do kontroli mszyc i przędziorków oraz szkodliwych roztoczy na roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Preparat wykazuje także wysoką skuteczność w zabezpieczeniu róż przed infekcją mączniaka prawdziwego. Działa w sposób mechaniczny, fizycznie oklejając i unieruchamiając szkodniki na powierzchni roślin lub w przypadku chorób grzybowych istotnie ograniczając rozwój objawów.

**Substancja czynna:**  
Naturalne polisacharydy


**Karencja, prewencja:**  
Nie dotyczy

| SZKODNIKI                                                                      | DAWKA                                                                                                                                           | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mszyce,<br/>Przędziorki,<br/>Szkodliwe roztocza,<br/>Mączniak prawdziwy</b> | <b>Rośliny rolnicze:</b><br>Stosować: 200 ml preparatu rozcieńczyć w 100 l wody. 200 l/ha.                                                      | <p>Preparat stosować po wystąpieniu pierwszych szkodników lub zauważeniu śladów choroby.</p> <p>W razie konieczności zabieg można powtórzyć po upływie 7-14 dni, a w przypadku zapobiegania chorobom grzybowym po 7 dniach.</p> <p>Przed zastosowaniem preparatu na rośliny, na każdej uprawie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie nastąpiły objawy uszkodzenia rośliny.</p> |
|                                                                                | <b>Rośliny sadowniczejabłonie, porzeczki, maliny, truskawki:</b><br>Stosować: 200 - 300 ml preparatu rozcieńczyć w 100 l wody. 500 - 1000 l/ha. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                | <b>Warzywa w gruncie i pod osłonami infestacja szkodnika:</b><br>Stosować: 100 - 200 ml preparatu rozcieńczyć w 100 l wody. 600 l/ha.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                | <b>Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami:</b><br>Stosować: 200 - 300 ml preparatu rozcieńczyć w 100 l wody. 600 l/ha.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## UWAGA!

Przed użyciem wstrząsnąć.  
Stosować po wystąpieniu pierwszych szkodników lub zauważeniu śladów choroby.  
Do przygotowania cieczy roboczej używać wody o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,0 - 6,5).  
Nie stosować częściej niż raz w tygodniu.

# AFIK<sup>®</sup> aerozol na mszyce i przędziorki



## OPAKOWANIA



**Pojemnik aerosolowy  
405/250 ml**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 405/250 ml  
- karton  
1764 szt. x 405/250 ml  
- paleta

## OPIS

Preparat w formie aerozolu, do kontroli mszyc, przędziorków, miseczników, tarczników oraz szkodliwych roztoczy w amatorskich uprawach roślin ozdobnych i innych (warzywnych i sadowniczych). Wykazuje także wysoką skuteczność w zabezpieczeniu róż przed infekcją mączniaka prawdziwego. Jego oparta na naturalnych składnikach formuła działa w sposób mechaniczny, fizycznie oklejając i unieruchamiając szkodniki na powierzchni roślin lub w przypadku chorób grzybowych istotnie ograniczając rozwój objawów.

**Substancja czynna:**  
Naturalne polisacharydy

**Karencja, prewencja:**  
Nie dotyczy

| SZKODNIKI                                                                             | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mszyce,<br/>Przędziorki,<br/>Miseczniki,<br/>Tarczники,<br/>Mączniak prawdziwy</b> | <p>Opryskiwać dokładnie całą roślinę z odległości 30 cm tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Dokładnie pokryć preparatem również dolną stronę liści. Unikać nanoszenia preparatu na płatki kwiatów. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 7 - 14 dniach, a w przypadku zapobiegania chorobom grzybowym po 7 dniach.</p> |

## UWAGA!

Przed zastosowaniem preparatu na rośliny, na każdej uprawie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie nastąpiły objawy uszkodzenia rośliny.  
Nie stosować częściej niż raz w tygodniu.  
Preparat stosować po wystąpieniu pierwszych szkodników lub zauważeniu śladów choroby.  
Zabieg wykonywać wcześniej rano lub późnym wieczorem tj. przed lub po oblocie pszczół, najlepiej w czasie niskiej wilgotności powietrza (w okresie bezdeszczowym), ponieważ preparat powinien szybko wyschnąć na roślinie.

# AFIK® atomizer



## OPAKOWANIA



**Atomizer 750 ml**  
opakowanie zbiorcze  
6 szt. x 750 ml - karton  
450 szt. x 750 ml - paleta

## OPIS

Preparat w gotowej do użycia formie atomizera, skuteczny w kontroli mszyc, przędziorków, miseczników i tarczników w amatorskich uprawach roślin ozdobnych i innych (warzywnych i sadowniczych). Jego oparta na naturalnych składnikach formuła działa w sposób mechaniczny, fizycznie oklejając i unieruchamiając szkodniki na powierzchni opryskiwanych roślin.

### Substancja czynna:

Naturalne polisacharydy

### Karencja, prewencja:

Nie dotyczy

| SZKODNIKI                                                                      | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mszyc,</b><br><b>Przędziorki,</b><br><b>Miseczniki,</b><br><b>Tarczники</b> | <p>Opryskiwać dokładnie całą roślinę z odległości 30 cm tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Dokładnie pokryć preparatem również dolną stronę liści. Unikać nanoszenia preparatu na płatki kwiatów. W razie konieczności zabieg można powtórzyć po 7 - 14 dniach.</p> |

## UWAGA!

Preparat stosować po wystąpieniu pierwszych szkodników.  
 Przed zastosowaniem preparatu na rośliny, na każdej uprawie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie nastąpiły objawy uszkodzenia rośliny.  
 Nie stosować częściej niż raz w tygodniu.  
 Zabieg wykonywać wcześniej rano lub późnym wieczorem tj. przed lub po oblocie pszczoł, najlepiej w czasie niskiej wilgotności powietrza (w okresie bezdeszczowym), ponieważ preparat powinien szybko wyschnąć na roślinie.

# AFIK® atomizer na ozdobne

Chroni róże i rośliny ozdobne



OPAKOWANIA



**Atomizer 750 ml**  
opakowanie zbiorcze  
6 szt. x 750 ml - karton  
450 szt. x 750 ml - paleta

## OPIS

Gotowa do użycia granulowana przynęta do zwalczania myszy lub szczurów wewnątrz budynków oraz szczurów wokół budynków przez użytkownika powszechnego.

**Substancja czynna:**  
Naturalne polisacharydy

**Karencja, prewencja:**  
Nie dotyczy

| SZKODNIKI                                                     | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mszyce,<br/>Przędziorki,<br/>Miseczniki,<br/>Tarczniki</b> | <p>Opryskiwać dokładnie całą roślinę z odległości 30 cm tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Dokładnie pokryć preparatem również dolną stronę liści. Unikać nanoszenia preparatu na płatki kwiatów. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 7 – 14 dniach.</p> |

## UWAGA!

Preparat stosować po wystąpieniu pierwszych szkodników lub zauważeniu śladów choroby. Przed zastosowaniem preparatu na rośliny, na każdej uprawie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie nastąpiły objawy uszkodzenia rośliny. Nie stosować częściej niż raz w tygodniu. Zabieg wykonywać wcześniej rano lub późnym wieczorem tj. przed lub po oblocie pszczoł, najlepiej w czasie niskiej wilgotności powietrza (w okresie bezdeszczowym), ponieważ preparat powinien szybko wyschnąć na roślinie.



# AFIK® zapobiega chorobom grzybowym



## OPAKOWANIA



**Atomizer 750 ml**  
opakowanie zbiorcze  
6 szt. x 750 ml - karton  
450 szt. x 750 ml - paleta

## OPIS

Preparat w formie atomizera, gotowy do użycia. Wykazuje wysoką skuteczność w zabezpieczeniu róż przed infekcją mączniaka prawdziwego. Jego opracowana na bazie naturalnych składników formuła działa w sposób mechaniczny, istotnie ograniczając rozwój choroby.

**Substancja czynna:**  
Naturalne polisacharydy

**Karencja, prewencja:**  
Nie dotyczy

| SZKODNIKI                             | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infekcja mączniaka prawdziwego</b> | <p>Opryskiwać dokładnie całą roślinę z odległości 30 cm tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Dokładnie pokryć preparatem również dolną stronę liści. Unikać nanoszenia preparatu na płatki kwiatów. W przypadku zapobiegania chorobom grzybowym zabieg można powtórzyć po upływie 7 dni.</p> |

## UWAGA!

Przed zastosowaniem preparatu na rośliny, na każdej uprawie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie nastąpiły objawy uszkodzenia rośliny.  
Nie stosować częściej niż raz w tygodniu.  
Preparat stosować po zauważeniu pierwszych śladów choroby.  
Zabieg wykonywać wcześnie rano lub późnym wieczorem tj. przed lub po oblocie pszczoł, najlepiej w czasie niskiej wilgotności powietrza (w okresie bezdeszczowym), ponieważ preparat powinien szybko wyschnąć na roślinie.

# AEROSOL NA MSZYCE AE



## OPAKOWANIA



**Pojemnik aerozolowy  
405 /250 ml**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 405/250 ml  
- karton  
1764 szt. x 405/250 ml  
- paleta

### OPIS

Preparat do kontroli mszyc, przędziorków, miseczników, tarczników w amatorskich uprawach roślin ozdobnych i innych warzywnych i sadowniczych. Działa w sposób mechaniczny przez utworzenie kleju wokół szkodników, na powierzchni opryskiwanych roślin.


**Substancja czynna:**  
Naturalne polisacharydy

**Karencja, prewencja:**  
Nie dotyczy

| SZKODNIKI                                                     | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mszyce,<br/>Przędziorki,<br/>Miseczniki,<br/>Tarczniki</b> | <p>Opryskiwać dokładnie całą roślinę z odległości 30 cm tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Dokładnie pokryć preparatem również dolną stronę liści. Unikać nanoszenia preparatu na płatki kwiatów. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 7 – 14 dniach, po zauważeniu żywych, ruszających się szkodników.</p> |

## UWAGA!

Stosować po wystąpieniu pierwszych szkodników.  
Przed zastosowaniem preparatu na rośliny, na każdej uprawie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie nastąpiły objawy uszkodzenia rośliny.  
Zabieg wykonywać wcześniej rano lub późnym wieczorem tj. przed lub po oblocie pszczół, najlepiej w czasie niskiej wilgotności powietrza (w okresie bezdeszczowym), ponieważ preparat powinien szybko wyschnąć na roślinie.



OPAKOWANIA



**Butelka 30 ml**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 30 ml - karton  
3000 szt. x 30 ml - paleta



**Butelka 1 L**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1 L - karton  
480 szt. x 1 L - paleta



**Kanister 3 L**  
opakowanie zbiorcze  
4 szt. x 3 L - karton  
224 szt. x 3 L - paleta

OPIS

Preparat do kontroli mszyc, przędziorków i szkodliwych roztoczy na roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Preparat powoduje także istotne ograniczenie rozwoju chorób grzybowych.

Działa w sposób mechaniczny dzięki klejącym właściwościom składników.

**Substancja czynna:**  
Naturalne polisacharydy

**Karencja, prewencja:**  
Nie dotyczy

| SZKODNIKI                                                                 | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mszyce,<br/>Przędziorki i szkodliwe roztocza,<br/>Choroby grzybowe</b> | <b>Rośliny rolnicze:</b><br>0,2% (200 ml środka w 100 l wody) zalecana ilość cieczy roboczej: 200 l/ha.<br>Mączniak prawdziwy: 0,1 – 0,2% (100 – 200 ml środka w 100 l wody).<br>Rdza: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).<br>Chwóścik buraka: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody).                                            |
|                                                                           | <b>Rośliny sadownicze – jabłonie, porzeczki, maliny, truskawki:</b><br>0,2% (200 ml środka w 100 l wody) zalecana ilość cieczy roboczej: 200 l/ha.<br>Mączniak prawdziwy: 0,1 – 0,2% (100 – 200 ml środka w 100 l wody).<br>Rdza: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).<br>Chwóścik buraka: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody). |
|                                                                           | <b>Warzywa w gruncie i pod osłonami:</b><br>0,2% (200 ml środka w 100 l wody) zalecana ilość cieczy roboczej: 200 l/ha.<br>Mączniak prawdziwy: 0,1 – 0,2% (100 – 200 ml środka w 100 l wody).<br>Rdza: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).<br>Chwóścik buraka: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody).                            |
|                                                                           | <b>Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami:</b><br>0,2-0,3% (200-300 ml środka w 100 l wody) zalecana ilość cieczy roboczej: 600 l/ha.<br>Mączniak prawdziwy: 0,1 – 0,2% (100 – 200 ml środka w 100 l wody).<br>Rdza: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).<br>Chwóścik buraka: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody).            |

UWAGA!

Stosować po wystąpieniu pierwszych szkodników.  
Do przygotowania cieczy roboczej używać wody o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,0 – 6,5).  
Przed użyciem wstrząsnąć.

# KRZEMIX®



## OPAKOWANIA



**Butelka 250 ml**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 250 ml - karton  
2000 szt. x 250 ml - paleta



**Butelka 1L**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1L - karton  
924 szt. x 1L - paleta

## OPIS

Mineralny stimulator wzrostu w uprawach warzywniczych, w gruncie i pod osłonami.

**Zawartość krzemu:**  
0,6 ± 0,15% m/m

## SPOSÓB UŻYCIA

### Podział ze względu na sposób stosowania

**Dolistnie:** 0,002 – 0,01% (1l preparatu na 500 - 1000 l wody/ha)

Opryskiwać rośliny, co 1 - 2 tygodnie, w zależności od zapotrzebowania i rodzaju roślin. Zabieg wykonać 2-3 krotnie w okresie wegetacji.

**Sporządzanie cieczy użytkowej:** 0,2% - 0,1%

Bezpośrednio przed opryskiem napęlić zbiornik opryskiwacza zalecaną ilością wody, włączyć mieszadło, dodać zalecaną ilość KRZEMIXu. Po rozcieńczeniu przystąpić do oprysku.

**Jako pożywka:** 0,00005% (1l preparatu na 20 000 l wody)

Można stosować do fertygacji, łącznie z nawożeniem lub oddzielnie.

**Sporządzanie cieczy użytkowej do fertygacji:** 0,005%

Najpierw sporządzić w oddzielnym zbiorniku stężony 0,5% roztwór pożywki w wodzie mieszając 5 litrów KRZEMIXu w proporcji na 1000 litrów roztworu. Następnie sporządzić 0,005% ciecz użytkową do fertygacji, rozcieńczając 100-krotnie w wodzie wcześniej sporządzony 0,5% roztwór pożywki.

### Podział ze względu na rodzaj rośliny

**Ogórek, pomidor:** 0,1%

Opryskiwać rozsady od 2 - 3 liści właściwych, zabieg powtórzyć w fazie 3 - 4 liści właściwych. Po wysadzeniu na miejsce stałe opryskiwać rośliny 2 - 3 krotnie do czasu kwitnienia roślin.

**Kalafior, brokuł:** 0,1%

Opryskiwać rozsady od 2 - 3 liści właściwych, zabieg powtórzyć 2 - 3 krotnie w czasie wegetacji roślin.

**Marchew:** 0,1%

Opryskiwać w fazie 3 - 5 liści właściwych, zabieg powtarzać w okresie intensywnego wzrostu naci.

**Salata:** 0,1%

Opryskiwać kilkakrotnie w czasie uprawy.

**Pozostałe gatunki:** 0,1%

Opryskiwać w zależności od kondycji i wymagań roślin.

## UWAGA!

Podane dawki należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę chemiczną zawartości składników w glebie, podłożu, pożywce i w roślinie, jak również w zależności od warunków pogodowych i stanu plantacji.



# Pułapka wabiąca muszkę owocówkę (gruszką)



## OPIS

Pułapka do zwabiania muszek owocowych, zapobiega ich rozmnażaniu. Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.

| SZKODNIK       | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muszkę owocową | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywować pułapkę pociągając za uchwyt w kształcie liścia. Liść musi zostać całkowicie oderwany. W przeciwnym razie skuteczność pułapki będzie mniejsza.</li> <li>2. Otworzyć buteleczkę z płynem.</li> <li>3. Wlać całą zawartość płynu do pułapki. <b>Nie rozcieńczać wodą!</b></li> <li>4. Gotową do użycia pułapkę umieścić w pobliżu miejsc gromadzenia się owadów np. owoców.</li> <li>5. Po upływie 4 tygodni pułapkę należy ponownie aktywować poprzez uzupełnienie płynem.</li> </ol> |

## OPAKOWANIA



1 pułapka; 1 x 30 ml płynu  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1 pułapka;  
- karton  
1400 szt. x 1 pułapka;  
- paleta

## UWAGA!

Podane dawki należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę chemiczną zawartości składników w glebie, podłożu, pożywce i w roślinie, jak również w zależności od warunków pogodowych i stanu plantacji.

# Pułapka wabiąca muszkę owocówkę (zestaw)



## OPAKOWANIA



zestaw zawiera:  
1 pułapka + 1 x 200 ml płynu  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. - karton

## OPIS

Pułapka jest przeznaczona do monitorowania aktywności muszki owocówki (*Drosophila melanogaster*) wewnątrz pomieszczeń, w piekarniach, cukierniach, dojrzewalniach owoców, zakładach przemysłu spożywczego, restauracjach, sklepach oraz w miejscach użyteczności publicznej.

### Substancja czynna:

Składniki pochodzenia spożywczego.

### Karencja, prewencja:

Nie dotyczy

| SZKODNIKI      | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muszka owocowa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wlać płyn wabiący do pułapki.</li> <li>2. Zamknąć pułapkę i umieścić w miejscu gromadzenia się owadów.</li> <li>3. Pułapkę opróżnić po miesiącu lub gdy jest w <math>\frac{3}{4}</math> wypełniona owadami.</li> </ol> |

## UWAGA!

**Warunki przechowywania:** Przechowywać w oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu z dala od dzieci i zwierząt domowych w temperaturze 5°C - 30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. **Środki ostrożności:** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: skontaktować się z lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

# Płyn do pułapki na muszkę owocówkę (uzupełniacz)



## OPAKOWANIA



**Butelka 200 ml**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 200 ml - karton

## OPIS

Płyn do pułapki przeznaczonej do monitorowania aktywności muszki owocówki (*Drosophila melanogaster*) wewnątrz pomieszczeń, w piekarniach, cukierniach, dojrzewalniach owoców, halach produkcyjnych zakładów przemysłu spożywczego, restauracjach, sklepach oraz w miejscach użyteczności publicznej. Wyjątkowy skład płynu monitorującego zapewnia skuteczne działanie.

### Substancja czynna:

Składniki pochodzenia spożywczego.

### Karencja, prewencja:

Nie dotyczy

| SZKODNIKI             | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muszka owocowa</b> | Muszka owocówka jest najbardziej aktywna w porach nocnych. Nie powinno się zmieniać położenia pułapki po zaobserwowaniu w niej owadów. Nie wolno myć pułapki za pomocą środków chemicznych. Nie należy umieszczać pułapki nieopodal naczyń oraz przedmiotów nadających się do spożycia. W celu swobodnego dostępu muszki do pułapki, należy nią delikatnie wstrząsać co kilka dni. |

## UWAGA!

**Środki ostrożności:** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: skontaktować się z lekarzem. **Warunki przechowywania:** Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach z dala od dzieci w temperaturze 5°C - 30°C.

# SILPEST



## OPAKOWANIA



**Butelka 250 ml**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 250 ml - karton  
2000 szt. x 250 ml - paleta



**Butelka 1L**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1L - karton  
924 szt. x 1L - paleta

## OPIS

Adiuwant do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków ochrony roślin lub nawozów dolistnych. Szczególnie zalecany do stosowania z herbicydami opartymi na solach słabych kwasów. Preparat można również stosować z fungicydami oraz insektycydami, zwłaszcza kiedy zależy nam na dobrym pokryciu cieczą użytkową opryskiwanych części roślin. Preparat obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środka ochrony roślin lub roztworu nawozu dolistnego. Lepiej zwilża powierzchnie liści. Poprawia wnikanie roztworu do rośliny, a także zwiększa skuteczność działania środka ochrony roślin lub nawozu. Preparat umożliwia zmniejszenie ilości wody użytej do oprysku o połowę.

## Zawiera:

Tlenek polialkilenu heptametylotrisiloksan i eter metylowy alliloksypolietylenoglikolu - 250 g/l

## Karencja:

Nie dotyczy

## SPOSÓB UŻYCIA

### Uprawa:


Zboża, kukurydza, rzepak, ziemniaki (tam gdzie stosowane jest nawożenie dolistne), w sadownictwie oraz warzywnictwie.

50 - 100 ml rozcieńczyć w 100 l wody

200 - 300 l/ha



# SUPER SZAMBEX



## OPAKOWANIA



**Butelka 500 ml**  
opakowanie zbiorcze  
25 szt. x 500 ml - karton  
lub sprzedaż pojedyncza

## OPIS

Biologiczny preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni. Usuwa nieprzyjemny i uciążliwy zapach z instalacji sanitarnych, zmniejsza ilość osadów dennych. Czyści i konserwuje systemy kanalizacyjne, a w przypadku nieszczelności może zapobiec skażeniu wód gruntowych.

Klasyfikacja: substancja ani mieszanina nie jest produktem niebezpiecznym zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008. Substancja nie została zakwalifikowana do substancji niebezpiecznych zgodnie z postanowieniami Dyrektywy UE 67/548/EWG.

## SPOSÓB UŻYCIA

Utylizacja ścieków w szambie i oczyszczalniach o pojemności do 20 m<sup>3</sup>: 1 opakowanie – 500 ml wlać do systemu kanalizacyjnego.

## UWAGA!

Podczas stosowania preparatu nie używać ostrych środków dezynfekujących, zwłaszcza zawierających związki chloru, które niszczą bakterie.

Przed użyciem wstrząsnąć.



# AKCESORIA

i pozostałe produkty



# Best-Fog

Symbol:  
BF



## OPIS

Bezwonny nośnik do odymiaczy spalinowych lub elektrycznych wspomagający proces zamgławiania preparatami rozpuszczalnymi w wodzie.

## DAWKA

0,8 – 1,2 l/1l cieczy roboczej.

## SPOSÓB UŻYCIA

Powoduje lepszą penetrację wolno opadającej mgły oraz lepsze zwilżenie powierzchni zamgławianych.

## OPAKOWANIA



**Kanister 5 L**  
opakowanie zbiorcze  
4 szt. x 5 L - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

# Karmnik na szczury BEST

Symbol:  
KAB



## OPAKOWANIA



**Karmnik**  
opakowanie zbiorcze  
36 szt. - karton  
540 szt. - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

## OPIS

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego odpornego na różne warunki atmosferyczne. W komplecie dołączone są: pręt do zamocowania przynęty wewnątrz stacji oraz śruba zabezpieczająca przed otwarciem przez osoby trzecie.

## Długość:

34 cm,

## Szerokość:

9 cm,

## Wysokość:

8 cm.

# Karmnik na myszy BEST

Symbol:  
KMB



## OPAKOWANIA



**Karmnik**  
opakowanie zbiorcze  
60 szt. - karton  
720 szt. - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

## OPIS

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego, ze śrubą zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem. Dzięki niewielkim gabarytom doskonale pasuje pod paletę lub niski regał.

**Długość:**

11 cm,

**Szerokość:**


8 cm,

**Wysokość:**

4 cm.

# Karmnik blaszany krótki

Symbol:  
KBK



## OPAKOWANIA



**Karmnik**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. - karton  
lub sprzedaż pojedyncza

## OPIS

Wykonany z solidnej ocynkowanej blachy, bardzo praktyczny i wytrzymały, świetnie nadaje się do zabezpieczenia obiektów na zewnątrz jak i wewnątrz. Bardzo praktyczna wyciągana tacka. Wyposażony w bolec, umożliwiający kontrolę nad preparatem. Pomysłowe i trwałe zabezpieczenie przed osobami trzecimi. Zasuwa z miejscem na założenie plomby.

**Długość:**

41.5 cm,

**Szerokość:**

8.5 cm,

**Wysokość:**

8.5 cm.



# Karmnik długi BEST

Symbol:  
KDB



## OPIS

Karmnik w kolorze czarnym, doskonały do stosowania przy ścianach, pod paletami, regałami itp., wykonany z elastycznego, wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporny na różne warunki atmosferyczne.

**Długość:**

62 cm,

**Szerokość:**

10 cm,

**Wysokość:**

10 cm.

## OPAKOWANIA



**Karmnik**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. - karton  
lub sprzedaż pojedyncza

# Lepowa pułapka na myszy

Symbol:  
PUM



## OPAKOWANIA



**Pułapka**  
opakowanie zbiorcze  
100 szt. - karton  
lub sprzedaż na sztuki.

## OPIS

Lepowa pułapka na myszy w postaci kartonu z warstwą silnego kleju.



# Lepowa pułapka na szczury

Symbol:  
PUSZ



## OPIS

Lepowa pułapka na szczury w postaci plastikowej czarnej kasety składającej się z dwóch części z warstwą silnego kleju.

**Szerokość:**

10 cm,

**Długość:**

20 cm.

## OPAKOWANIA



### Pułapka

opakowanie zbiorcze  
50 szt. x 2 szt. - karton  
lub sprzedaż  
w komplecie (po 2 szt.).

# Lepy na szczury i myszy

Symbol:  
LPNM

Symbol:  
LPNSZ



## OPIS

Zdjąć papier ochronny, złożyć wzdłuż linii perforacji w kształt trójkąta lub pozostawić rozłożoną. Gotową pułapkę umieścić w miejscach największego skupienia gryzoni. Po złapaniu szkodnika użytą pułapkę wyrzucić.

## OPAKOWANIA



### Pułapka

opakowanie zbiorcze  
125 szt. - karton  
lub sprzedaż na sztuki.

# Myszolapki drewniane i metalowe

drewniana

Symbol:  
MYSZO

metalowa

Symbol:  
MYSZ


## OPIS

Urządzenia mechaniczne do odławiania np. w pomieszczeniach drobnych gryzoni myszowatych przy pomocy przynęt pokarmowych.

Długość:

10 cm,

Szerokość:

5.5 cm,

## OPAKOWANIA



**Myszolapka drewniana**  
opakowanie zbiorcze  
50 szt. - karton  
500 szt. - paleta



**Myszolapka metalowa**  
opakowanie zbiorcze  
50 szt. - karton  
500 szt. - paleta

# Lep na muchy okrągły

Symbol:  
MLO


## OPIS

Taśma lepowa do zwalczania much i innych owadów latających. Na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń (mieszkania, pomieszczenia gospodarskie, tarasy, balkony, altany).

## SZKODNIK

Muchy i inne owady latające.

## SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć wieczko, pociągając za wystającą tasiemkę, wyjąć lep. Rozwinąć go delikatnie i powiesić w miejscu masowego pojawienia się much. Nie wieszać na przeciągu i w miejscach silnie ogrzewanych przez słońce.

## OPAKOWANIA



**Lep okrągły**  
opakowanie zbiorcze  
100 szt. - karton  
1000 szt. - paleta

## UWAGI!

Taśmę lepową umieszczać poza zasięgiem dzieci i zwierząt gospodarskich.

W przypadku mocnego zabrudzenia skóry klejem zmyć ją wodą z klejem.

Po użyciu taśmę lepową traktować jako odpad komunalny.

# Muchomox lep na muchy w rolce

Symbol:  
MLR24



## OPIS

Taśma lepowa do zwalczania much i innych owadów latających. We wszystkich pomieszczeniach, a zwłaszcza gospodarczych, magazynach, przetwórnich itp.

## SZKODNIK

Muchy i inne owady latające.

## SPOSÓB UŻYCIA

Zawiesić w miejscu gromadzenia się owadów, rozwijać z rolki i zdejmować papier ochronny w miarę potrzeby.

## OPAKOWANIA



**Lep na muchy w rolce**  
**0,24 x 10 m**

opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 0,24 x 10 m lub  
sprzedaż pojedyncza

## UWAGI!

Taśmę lepową umieszczać poza zasięgiem dzieci i zwierząt gospodarskich.

W przypadku mocnego zabrudzenia skóry klejem zmyć ją wodą.

Po użyciu taśmę lepową traktować jako odpad komunalny.

# Pułapka klejowa PANKO

mała i duża

Symbol:  
TRAP3

Symbol:  
TRAP4



## OPIS

Pułapka klejowa do monitoringu owadów biegających z przynętą w formie tabletki.

## MAŁA

**Długość:**

11 cm,

**Szerokość:**

7 cm,

## DUŻA

**Długość:**

20 cm,

**Szerokość:**

10 cm,

## OPAKOWANIA



**Pułapka z tabletką małą**  
opakowanie zbiorcze  
30 szt. - karton



**Pułapka z tabletką dużą**  
opakowanie zbiorcze  
15 szt. - karton





# ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN





SLUGIX  
3 GB

## OPIS

SLUGIX 3 GB jest środkiem ślimakobójczym w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków nągich. Środek przeznaczony do stosowania ręcznie lub przy użyciu mechanicznych aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.

**Substancja czynna:**

Metaldehyd – 3% (30 g/kg)

**Karencja:**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy  
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

## OPAKOWANIA

**Puszka 200 g**

opakowanie zbiorcze  
16 szt. x 200 g - karton  
2000 szt. x 200 g - paleta

**Puszka 1 kg**

opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1 kg - karton  
504 szt. x 1 kg - paleta

**Worek 25 kg**

30 szt. x 25 kg - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

**UWAGA!**

Dawka i sposób użycia

s. 47



# SLUGIX 3 GB

## SZKODNIK

### Ślimaki

## DAWKA

#### Zboża

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca fazy krzewienia (do BBCH 29).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Rzepak ozimy, rzepak jary

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca fazy krzewienia (do BBCH 29).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do fazy 5 liści (do BBCH 15).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Salata, rokitka siewna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować od sadzenia do fazy, gdy rozeta jest całkowicie rozwinięta lub główny pęd osiągnął wielkość typową dla odmiany (do BBCH 39).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Kapusta głowiasta

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 5 liścia (do BBCH 15).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Len oleisty uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (do BBCH 17).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Mak uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (do BBCH 17).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Lnicznik siewny (Inianka siewna)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (do BBCH 17).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Ślonecznik uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (do BBCH 17).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Gorczyca biała, gorczyca sarepska

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca formowania pędów bocznych, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych (do BBCH 29).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Soja

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu (do BBCH 29).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Winorośl

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować od posadzenia do końca fazy kwitnienia (do BBCH 69).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Pigwa pospolita, nieszpuka zwyczajna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu do końca fazy 9 lub więcej widocznych pędów (do BBCH 29).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Rośliny ozdobne

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).  
Środek rozsypany równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.


## SPOSÓB UŻYCIA

Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.  
Środek najlepiej stosować przy łagodnej, wilgotnej pogodzie, gdy ślimaki są najbardziej aktywne.  
W przypadku dużego nasilenia występowania ślimaków nagich może być konieczne powtarzanie zabiegów.  
Nie stosować podczas silnych opadów deszczu, który może zmniejszyć trwałość granul.  
Późne zastosowanie w uprawach roślin o rozłożystych liściach może spowodować pozostanie granul na liściach.  
Należy zachować ostrożność podczas stosowania w uprawach roślin bezpośrednio przeznaczonych do spożycia.

## UWAGA!

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.  
Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas zbiorów roślin.  
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie dotykać. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.  
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.  
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.  
Zebrać rozsypany przypadkowo produkt.

# PIRIMIX NOWY AE



## OPAKOWANIA



**Pojemnik aerozolowy  
405/300 ml**  
opakowanie zbiorcze  
24 szt. x 405/300 ml  
- karton  
1680 szt. x 405/300 ml  
- paleta

### OPIS

Środek mszycobójczy w formie aerozolu o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc w amatorskiej uprawie róż w ogrodach działkowych i przydomowych.

**Substancja czynna:**

Pyretryny - 1,2 g/kg

**Karencja:**

Róża (w gruncie): Nie dotyczy


| SZKODNIK                        | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mszycy różano-szczeciowa</b> | Opryskiwać roślinę z odległości nie mniejszej niż 30 cm, krótkotrwałymi strumieniami trwającymi maksymalnie 2 sek. Opryskiwać dokładnie roślinę tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Pokryć równomiernie również dolną część liści. |

**UWAGA !**

Przed użyciem wstrząsnąć.

Opryskiwać miejsca na roślinie, w których wystąpiły mszyce. Preparat stosować po zauważeniu szkodnika.





NOWOŚCI





# BEST-PEST na mrówki duo



## OPAKOWANIA



**Pojemnik 250 g**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. x 250 g - karton  
2000 szt. x 250 g - paleta



**Butelka 500 g**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 500 g - karton  
768 szt. x 500 g - paleta

## OPIS

Preparat owadobójczy, granulat przeznaczony do zwalczania mrówek oraz ich gniazd; do użycia wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, w budynkach użytku publicznego (hotelach, restauracjach, kinach, szpitalach), w obiektach gospodarczych, przemysłowych (w tym przemyśle spożywczym), handlowo-usługowych, biurowych, sportowych, w pustych magazynach oraz na zewnątrz pomieszczeń na terenach przyległych o utwardzonej powierzchni tj. na balkonach, tarasach, podjazdach, chodnikach, ścieżkach i placach.

### Substancja czynna:

Cypermetyryna - 5 g/kg

Tetrametryna - 0,5 g/kg

| SZKODNIKI      | DAWKA                                                                                            | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gniazda mrówek | 10 g preparatu na 1 m <sup>2</sup> powierzchni, na której bytują mrówki lub na 1 gniazdo mrówek. | Rozsypać równomiernie widoczną warstwę na powierzchni gniazda i na ścieżkach, którymi wędrują owady (na utwardzonej powierzchni). Wewnątrz pomieszczeń wysypać niewielką ilość preparatu na tacki lub wieczka od słoików i rozstawić w miejscach gromadzenia się mrówek oraz na ścieżkach ich przebiegu. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, powtórzyć zabieg. W przypadku zawilgocenia wyłożyć świeżą porcję preparatu. Czas od zastosowania do uzyskania skutku biobójczego: natychmiastowe, pełen efekt biobójczy następuje po 48 godzinach od zastosowania. |

**Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.**

**Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

# RAT KILLER® ZIARNO



## OPAKOWANIA



**Karton 10 kg**  
opakowanie zbiorcze  
40 szt. x 10 kg - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

### OPIS

Gotowy do użycia rodentycyd w formie przynęty w postaci ziarna do zwalczania myszy domowych i szczurów wędrownych (wewnątrz i wokół budynku).

**Substancja czynna:**  
Brodifakum - 0,0029 g/100 g

| SZKODNIKI                                                                                   | DAWKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mysz domowa</b><br>(Mus musculus)<br>do użytku<br>wewnątrz i wokół<br>budynków:          | <p><b>Wysoka infestacja:</b><br/>Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.</p> <p><b>Niska infestacja:</b><br/>Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.</p>     | <p>Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonię. Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).</p> |
| <b>Szczur wędrowny</b><br>(Rattus norvegicus)<br>do użytku<br>wewnątrz i wokół<br>budynków: | <p><b>Wysoka infestacja:</b><br/>Do 100 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.</p> <p><b>Niska infestacja:</b><br/>Do 100 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.</p> | <p>Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonię. Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).</p> |

**Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.**  
**Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## UWAGA!

Narazenie skóry - zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem.  
Zanieczyszczoną odzież należy uprać przed ponownym założeniem.  
Narazenie oka - przemywać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki otwarte, przez co najmniej 10 minut. Skonsultować się z lekarzem - okulista.  
Narazenie po spożyciu - dokładnie wypłukać usta wodą. Skontaktować się z lekarzem, pokazać etykietę preparatu.

N  
O  
W  
O  
Ś  
Ć

## Karmnik plastikowy Coral

Symbol:  
COR



### OPIS

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego, posiada tackę z prętem na trutkę. Dzięki niewielkim gabarytom doskonale pasuje pod paletę lub niski regał. Posiada także dystans, który umożliwia przymocowanie go do ściany, oraz przegląd karmnika bez potrzeby całkowitego demontażu.

**Długość:**

23 cm,

**Szerokość:**

13 cm,

**Wysokość:**

8 cm.



OPAKOWANIA



**Karmnik**

opakowanie zbiorcze  
30 szt. - karton  
lub sprzedaż pojedyncza

N  
O  
W  
O  
Ś  
Ć

## Karmnik na szczury z kluczykiem

Symbol:  
KABB



### OPIS

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Wyposażony jest w pręt do zamocowania w środku kostki lub pasty deratyzacyjnej. Posiada praktyczne zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych w postaci kluczyka. Każdy karmnik posiada w komplecie jeden kluczyk.

**Długość:**

33,5 cm,

**Szerokość:**

10 cm,

**Wysokość:**

9 cm.



OPAKOWANIA



**Karmnik**

opakowanie zbiorcze  
36 szt. - karton  
lub sprzedaż pojedyncza

N  
O  
W  
O  
Ś  
Ć

# Karmnik z dwoma kluczykami NEPTUNO

Symbol:  
NEP



## OPIS

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego. Do karmnika NEPTUNO proponujemy dodatkowe wyposażenie: podstawkę z prętem, poidło lub lep żywotłowny. Posiada dystans umożliwiający przegląd karmnika bez potrzeby całkowitego demontażu.

| Długość: | Szerokość: | Wysokość: |
|----------|------------|-----------|
| 23 cm,   | 18,5 cm,   | 10 cm.    |

## OPAKOWANIA




**Karmnik**  
opakowanie zbiorcze  
20 szt. - karton  
lub sprzedaż pojedyncza

N  
O  
W  
O  
Ś  
Ć

# Karmnik w formie kamienia ROCK

Symbol:  
ROC



## OPIS

Wykonany z lanego, twardego tworzywa sztucznego odporny na działanie warunków atmosferycznych. Kształtem imituje kamień. Doskonale nadaje się do zastosowania na zewnątrz budynków, idealnie komponuje się z otoczeniem np. w ogrodzie. Posiada specjalny szpikulec umożliwiający wbicie w ziemię. Do otwierania szufladki z trutką stosuje się specjalny kluczyczek zabezpieczający. Wewnątrz znajduje się drut umożliwiający zamocowanie na nim kostek i saszetek deratyzacyjnych. Posiada „kolec” umożliwiający zamontowanie karmnika w gruncie.

| Długość: | Szerokość: | Wysokość: |
|----------|------------|-----------|
| 22 cm,   | 18 cm,     | 10 cm.    |

## OPAKOWANIA



**Karmnik**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. - karton  
lub sprzedaż pojedyncza



# Lima Oro 5 GB



## OPIS

MOLUSKOCYD w formie przynęty granulowanej, przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich. Środek przeznaczony do stosowania ręcznie lub przy użyciu mechanicznych aplikatorów do granulowanych preparatów. Produkt do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

**Substancja czynna:**  
Metaldehyd – 5% (50 g/kg)

### Karencja:

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej: Nie dotyczy.

1. Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.
2. Środek najlepiej stosować przy łagodnej, wilgotnej pogodzie, gdy ślimaki są najbardziej aktywne. W przypadku dużego nasilenia występowania ślimaków nagich może być konieczne powtórzenie zabiegu.
3. Nie stosować podczas silnych opadów deszczu, który może zmniejszyć trwałość granul.
4. Późne zastosowanie w uprawach roślin o rozłożystych liściach może spowodować pozostanie granul na liściach. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w uprawach roślin bezpośrednio przeznaczonych do spożycia.



## OPAKOWANIA



**Pojemnik 1 kg**  
opakowanie zbiorcze  
12 szt. x 1 kg - karton  
504 szt. x 1 kg - paleta



**Worek 25 kg**  
30 szt. x 25 kg - paleta  
lub sprzedaż pojedyncza

**UWAGA!**

Dawka i sposób użycia

s. 55



# Lima Oro 5 GB

## SZKODNIK

Ślimaki

## DAWKA

### Zboża

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH 29).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Rzepak ozimy, rzepak jary

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH 29).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Stosować po siewie do fazy 5 liści (BBCH 15).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Salata, rókietta siewna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Stosować od sadzenia do fazy, gdy rozeta jest całkowicie rozwinięta lub główny pęd osiągnął wielkość typową dla odmiany (BBCH 39).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Kapusta głowiasta

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.  
Maksymalna liczba zabiegów: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 5 liścia (do BBCH 15).  
Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

### Len oleisty uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Mak uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Lnicznik siewny (Inianka siewna)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Ślonecznik uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Gorczyca biała, gorczyca sarepska

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca formowania pędów bocznych, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 29).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Soja

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 29).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Dynia uprawiana na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia na pędzie głównym (BBCH 17).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.  
UWAGA:

**Miąkszu dyni nie stosować do celów spożywczych i paszowych.**

### Winorośl

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować od posadzenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Grusza, pigwa pospolita, nieszpuka zwyczajna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu do końca fazy 9 lub więcej widocznych pędów (BBCH 29).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Seler korzeniowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≈ BBCH 15).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Chrzan pospolity

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≈ BBCH 15).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Brukiew jadalna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≈ BBCH 15).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastewna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≈ BBCH 15).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Burak pastewny, burak ćwikłowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≈ BBCH 15).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### Rośliny ozdobne


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

## UWAGA!

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.  
Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas zbiorów roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):  
Zwierzęta domowe oraz gospodarskie należy utrzymywać poza obszarami poddanymi działaniu środka ochrony roślin.

# NOTATKI



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across most of the page width, leaving small margins on the left and right.